

表 3711 HDL-C濃度(mg/dL) 性別（透析患者全体）

性別	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	575	12,246	33,358	33,850	22,277	12,091	5,386	2,473	1,094	977	124,327	73,814	198,141	46.55	15.86
(%)	(0.5)	(9.8)	(26.8)	(27.2)	(17.9)	(9.7)	(4.3)	(2.0)	(0.9)	(0.8)	(100.0)				
女性	221	3,377	12,489	17,502	15,284	10,145	5,606	2,756	1,237	1,024	69,641	42,326	111,967	52.67	17.45
(%)	(0.3)	(4.8)	(17.9)	(25.1)	(21.9)	(14.6)	(8.0)	(4.0)	(1.8)	(1.5)	(100.0)				
合計	796	15,623	45,847	51,352	37,561	22,236	10,992	5,229	2,331	2,001	193,968	116,140	310,108	48.75	16.71
(%)	(0.4)	(8.1)	(23.6)	(26.5)	(19.4)	(11.5)	(5.7)	(2.7)	(1.2)	(1.0)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	796	15,623	45,847	51,352	37,561	22,236	10,992	5,229	2,331	2,001	193,968	116,140	310,108	48.75	16.71
(%)	(0.4)	(8.1)	(23.6)	(26.5)	(19.4)	(11.5)	(5.7)	(2.7)	(1.2)	(1.0)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査