

表 3777 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 透析後体重(kg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析後体重	50未満	50～	70～	90～	110～	130～	150～	170～	190～	210～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)		3 (42.9)	2 (28.6)	1 (14.3)				1 (14.3)			7 (100.0)	5	12	90.43	40.96
20～ (%)	1 (2.5)	2 (5.0)	8 (20.0)	10 (25.0)	11 (27.5)	4 (10.0)	3 (7.5)		1 (2.5)		40 (100.0)	36	76	109.10	31.62
30～ (%)	37 (2.2)	137 (8.1)	320 (19.0)	426 (25.3)	370 (21.9)	221 (13.1)	104 (6.2)	48 (2.8)	16 (0.9)	8 (0.5)	1,687 (100.0)	995	2,682	108.33	32.67
40～ (%)	127 (2.0)	577 (9.0)	1,294 (20.2)	1,634 (25.5)	1,319 (20.6)	808 (12.6)	374 (5.8)	172 (2.7)	74 (1.2)	36 (0.6)	6,415 (100.0)	3,590	10,005	107.35	33.14
50～ (%)	190 (2.3)	842 (10.4)	1,776 (21.9)	2,050 (25.2)	1,570 (19.3)	914 (11.3)	474 (5.8)	196 (2.4)	64 (0.8)	45 (0.6)	8,121 (100.0)	4,369	12,490	104.91	33.06
60～ (%)	107 (2.0)	559 (10.3)	1,105 (20.4)	1,330 (24.5)	1,098 (20.2)	668 (12.3)	344 (6.3)	136 (2.5)	57 (1.0)	25 (0.5)	5,429 (100.0)	2,936	8,365	106.50	33.11
70～ (%)	48 (2.2)	179 (8.0)	408 (18.3)	516 (23.1)	482 (21.6)	306 (13.7)	182 (8.2)	67 (3.0)	26 (1.2)	15 (0.7)	2,229 (100.0)	1,194	3,423	110.28	34.03
80～ (%)	10 (1.2)	67 (8.0)	143 (17.0)	169 (20.1)	204 (24.2)	127 (15.1)	61 (7.2)	38 (4.5)	17 (2.0)	6 (0.7)	842 (100.0)	431	1,273	113.90	35.20
90～ (%)	5 (1.6)	21 (6.6)	45 (14.2)	70 (22.1)	58 (18.3)	62 (19.6)	33 (10.4)	14 (4.4)	4 (1.3)	5 (1.6)	317 (100.0)	138	455	117.96	36.97
100～ (%)	2 (2.2)	7 (7.6)	11 (12.0)	17 (18.5)	20 (21.7)	15 (16.3)	9 (9.8)	8 (8.7)	2 (2.2)	1 (1.1)	92 (100.0)	50	142	120.33	37.71
110～ (%)		2 (5.3)	6 (15.8)	10 (26.3)	11 (28.9)	3 (7.9)	5 (13.2)	1 (2.6)			38 (100.0)	23	61	114.21	29.22
120～ (%)		1 (3.7)	1 (3.7)	3 (11.1)	6 (22.2)	10 (37.0)	4 (14.8)	1 (3.7)	1 (3.7)		27 (100.0)	10	37	131.00	30.26
合計 (%)	527 (2.1)	2,397 (9.5)	5,119 (20.3)	6,236 (24.7)	5,149 (20.4)	3,138 (12.4)	1,593 (6.3)	682 (2.7)	262 (1.0)	141 (0.6)	25,244 (100.0)	13,777	39,021	107.14	33.39
記載なし (%)	2 (2.4)	6 (7.1)	19 (22.6)	29 (34.5)	13 (15.5)	11 (13.1)	4 (4.8)				84 (100.0)	841	925	101.44	27.80
総計 (%)	529 (2.1)	2,403 (9.5)	5,138 (20.3)	6,265 (24.7)	5,162 (20.4)	3,149 (12.4)	1,597 (6.3)	682 (2.7)	262 (1.0)	141 (0.6)	25,328 (100.0)	14,618	39,946	107.12	33.37
平均	55.83	56.61	56.20	56.25	56.96	57.61	58.22	58.19	57.94	58.26	56.78	56.34	56.63		
標準偏差	11.88	12.04	12.09	12.58	13.49	14.17	14.40	14.96	14.93	14.41	13.06	12.97	13.03		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査