

表 3787 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 収縮期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

収縮期血圧	50未満	50～	70～	90～	110～	130～	150～	170～	190～	210～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)										1 (100.0)	1 (100.0)		1	221.00	
60～ (%)	1 (9.1)	1 (9.1)	2 (18.2)	2 (18.2)	2 (18.2)	2 (18.2)				1 (9.1)	11 (100.0)	2	13	117.27	63.80
80～ (%)		1 (1.3)	11 (14.7)	14 (18.7)	14 (18.7)	13 (17.3)	10 (13.3)	8 (10.7)	2 (2.7)	2 (2.7)	75 (100.0)	49	124	128.64	37.42
100～ (%)	2 (0.5)	8 (2.1)	36 (9.5)	60 (15.9)	87 (23.0)	80 (21.2)	48 (12.7)	31 (8.2)	11 (2.9)	15 (4.0)	378 (100.0)	263	641	132.54	40.87
120～ (%)	4 (0.4)	29 (3.0)	97 (10.0)	189 (19.4)	227 (23.3)	180 (18.5)	116 (11.9)	76 (7.8)	27 (2.8)	29 (3.0)	974 (100.0)	542	1,516	128.59	37.68
140～ (%)	7 (0.7)	39 (3.7)	111 (10.4)	184 (17.2)	260 (24.3)	192 (18.0)	135 (12.6)	86 (8.1)	36 (3.4)	18 (1.7)	1,068 (100.0)	511	1,579	127.18	36.95
160～ (%)	3 (0.7)	14 (3.0)	51 (11.1)	111 (24.1)	80 (17.4)	91 (19.7)	61 (13.2)	27 (5.9)	15 (3.3)	8 (1.7)	461 (100.0)	260	721	125.52	36.51
180～ (%)		6 (4.3)	10 (7.2)	33 (23.9)	28 (20.3)	27 (19.6)	16 (11.6)	9 (6.5)	8 (5.8)	1 (0.7)	138 (100.0)	79	217	127.49	35.69
200～ (%)		1 (4.8)	2 (9.5)	4 (19.0)	5 (23.8)	4 (19.0)	3 (14.3)		1 (4.8)	1 (4.8)	21 (100.0)	10	31	127.86	39.15
220～ (%)			1 (16.7)	1 (16.7)	1 (16.7)		2 (33.3)	1 (16.7)			6 (100.0)	4	10	131.50	34.89
合計 (%)	17 (0.5)	99 (3.2)	321 (10.2)	598 (19.1)	704 (22.5)	589 (18.8)	391 (12.5)	238 (7.6)	100 (3.2)	76 (2.4)	3,133 (100.0)	1,720	4,853	128.08	37.73
記載なし (%)	1 (0.3)	15 (4.0)	30 (7.9)	62 (16.4)	93 (24.6)	73 (19.3)	45 (11.9)	25 (6.6)	20 (5.3)	14 (3.7)	378 (100.0)	3,710	4,088	131.72	40.19
総計 (%)	18 (0.5)	114 (3.2)	351 (10.0)	660 (18.8)	797 (22.7)	662 (18.9)	436 (12.4)	263 (7.5)	120 (3.4)	90 (2.6)	3,511 (100.0)	5,430	8,941	128.47	38.01
平均	136.00	144.89	141.35	143.42	140.52	141.30	142.48	139.60	144.74	133.24	141.55	140.02	141.01		
標準偏差	24.47	22.62	22.27	22.92	21.47	22.78	23.11	21.76	23.65	24.52	22.56	23.43	22.88		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査