

表 3809 透析前収縮期血圧(mmHg) 性別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

性別	60未満	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	1 (0.0)	63 (0.3)	328 (1.5)	1,550 (7.0)	4,716 (21.3)	7,362 (33.3)	5,414 (24.5)	2,057 (9.3)	510 (2.3)	131 (0.6)	22,132 (100.0)	3,062	25,194	151.57	24.42
女性 (%)	1 (0.0)	52 (0.4)	287 (2.2)	1,250 (9.6)	2,923 (22.5)	4,071 (31.4)	2,894 (22.3)	1,097 (8.5)	312 (2.4)	85 (0.7)	12,972 (100.0)	1,780	14,752	149.13	26.00
合計 (%)	2 (0.0)	115 (0.3)	615 (1.8)	2,800 (8.0)	7,639 (21.8)	11,433 (32.6)	8,308 (23.7)	3,154 (9.0)	822 (2.3)	216 (0.6)	35,104 (100.0)	4,842	39,946	150.67	25.04
記載なし (%)															
総計 (%)	2 (0.0)	115 (0.3)	615 (1.8)	2,800 (8.0)	7,639 (21.8)	11,433 (32.6)	8,308 (23.7)	3,154 (9.0)	822 (2.3)	216 (0.6)	35,104 (100.0)	4,842	39,946	150.67	25.04

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査