

表 3928 使用透析液の種類 性別（腹膜透析患者）

性別	1.5%液のみ	1.5%液と2.5%液の併用	2.5%液のみ	4.25%液のみ（イコデキストリンなし）	イコデキストリン単独（ブドウ糖使用なし）	1.5%+イコデキストリン	1.5%+2.5%+イコデキストリン	2.5%+イコデキストリン	4.25%液+イコデキストリン	合計	不明	記載なし	総計
男性	1,399	489	103	4	25	823	339	291	3	3,476	49	2,217	5,742
(%)	(40.2)	(14.1)	(3.0)	(0.1)	(0.7)	(23.7)	(9.8)	(8.4)	(0.1)	(100.0)			
女性	876	298	74	4	32	399	220	150	3	2,056	16	1,127	3,199
(%)	(42.6)	(14.5)	(3.6)	(0.2)	(1.6)	(19.4)	(10.7)	(7.3)	(0.1)	(100.0)			
合計	2,275	787	177	8	57	1,222	559	441	6	5,532	65	3,344	8,941
(%)	(41.1)	(14.2)	(3.2)	(0.1)	(1.0)	(22.1)	(10.1)	(8.0)	(0.1)	(100.0)			
記載なし													
(%)													
総計	2,275	787	177	8	57	1,222	559	441	6	5,532	65	3,344	8,941
(%)	(41.1)	(14.2)	(3.2)	(0.1)	(1.0)	(22.1)	(10.1)	(8.0)	(0.1)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。  
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2014年調査