

表 3938 使用透析液の種類 医療機関別（腹膜透析単独患者）

医療機関	1.5%液のみ	1.5%液と2.5%液の併用	2.5%液のみ	4.25%液のみ（イコデキストリンなし）	イコデキストリン単独（ブドウ糖使用なし）	1.5%+イコデキストリン	1.5%+2.5%+イコデキストリン	2.5%+イコデキストリン	4.25%液+イコデキストリン	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学	210	30	9	2	4	99	35	15		404		237	641
（%）	(52.0)	(7.4)	(2.2)	(0.5)	(1.0)	(24.5)	(8.7)	(3.7)		(100.0)			
私立大学	275	53	19		10	121	33	50		561		406	967
（%）	(49.0)	(9.4)	(3.4)		(1.8)	(21.6)	(5.9)	(8.9)		(100.0)			
国立	63	8	3		1	45	8	3		131		54	185
（%）	(48.1)	(6.1)	(2.3)		(0.8)	(34.4)	(6.1)	(2.3)		(100.0)			
県市町村立	362	94	14	3	14	191	73	51	1	803	2	515	1,320
（%）	(45.1)	(11.7)	(1.7)	(0.4)	(1.7)	(23.8)	(9.1)	(6.4)	(0.1)	(100.0)			
社会保険	90	18			3	42	13	5		171	1	266	438
（%）	(52.6)	(10.5)			(1.8)	(24.6)	(7.6)	(2.9)		(100.0)			
厚生連	140	57	8		2	92	17	25		341		153	494
（%）	(41.1)	(16.7)	(2.3)		(0.6)	(27.0)	(5.0)	(7.3)		(100.0)			
その他公的	370	101	21		3	151	49	50	1	746	2	341	1,089
（%）	(49.6)	(13.5)	(2.8)		(0.4)	(20.2)	(6.6)	(6.7)	(0.1)	(100.0)			
私立総合	93	47	8		2	25	23	16		214		40	254
（%）	(43.5)	(22.0)	(3.7)		(0.9)	(11.7)	(10.7)	(7.5)		(100.0)			
私立	318	102	31	2	10	175	73	52		763	40	499	1,302
（%）	(41.7)	(13.4)	(4.1)	(0.3)	(1.3)	(22.9)	(9.6)	(6.8)		(100.0)			
私立診療所	170	55	13		2	64	42	27	1	374	3	121	498
（%）	(45.5)	(14.7)	(3.5)		(0.5)	(17.1)	(11.2)	(7.2)	(0.3)	(100.0)			
総計	2,091	565	126	7	51	1,005	366	294	3	4,508	48	2,632	7,188
（%）	(46.4)	(12.5)	(2.8)	(0.2)	(1.1)	(22.3)	(8.1)	(6.5)	(0.1)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査