

表 3953 一日透析液使用量(L/日) 治療方法(新分類)別(腹膜透析単独患者)

治療方法 (新分類)	2未満	2~	4~	6~	8~	10~	12~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD)	75 (3.1)	275 (11.3)	610 (25.1)	882 (36.3)	524 (21.6)	39 (1.6)	26 (1.1)	2,431 (100.0)	1,701	4,132	5.84	2.32
腹膜透析 (APD)	22 (1.5)	86 (5.8)	323 (21.9)	470 (31.8)	360 (24.4)	156 (10.6)	60 (4.1)	1,477 (100.0)	859	2,336	7.08	2.71
腹膜透析 (CCPD)	9 (1.8)	10 (2.0)	53 (10.8)	141 (28.7)	157 (32.0)	78 (15.9)	43 (8.8)	491 (100.0)	229	720	8.27	3.19
合計 (%)	106 (2.4)	371 (8.4)	986 (22.4)	1,493 (33.9)	1,041 (23.7)	273 (6.2)	129 (2.9)	4,399 (100.0)	2,789	7,188	6.53	2.70
記載なし (%)												
総計 (%)	106 (2.4)	371 (8.4)	986 (22.4)	1,493 (33.9)	1,041 (23.7)	273 (6.2)	129 (2.9)	4,399 (100.0)	2,789	7,188	6.53	2.70

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査