

表 4004 一日平均除水量(mL/日) 原疾患別 (PD・HD(F)等併用患者)

原疾患	－1000未満	－1000～	0～	1000～	2000～	3000～	4000～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	1 (0.3)	4 (1.0)	198 (51.4)	171 (44.4)	10 (2.6)	1 (0.3)		385 (100.0)	342	727	935.68	483.18
慢性腎盂腎炎 (%)			10 (90.9)	1 (9.1)				11 (100.0)	3	14	798.18	323.73
急速進行性糸球 体腎炎 (%)			3 (60.0)	2 (40.0)				5 (100.0)	5	10	750.00	324.04
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)			3 (60.0)	2 (40.0)				5 (100.0)	5	10	997.00	436.49
その他の分類不 能の腎炎 (%)			5 (50.0)	5 (50.0)				10 (100.0)	9	19	985.00	296.32
多発性嚢胞腎 (%)		1 (4.3)	14 (60.9)	8 (34.8)				23 (100.0)	14	37	779.74	457.70
腎硬化症 (%)			34 (48.6)	34 (48.6)	2 (2.9)			70 (100.0)	73	143	931.31	474.08
悪性高血圧 (%)			5 (41.7)	6 (50.0)	1 (8.3)			12 (100.0)	10	22	1213.33	669.36
糖尿病性腎症 (%)		5 (2.1)	111 (45.7)	122 (50.2)	4 (1.6)	1 (0.4)		243 (100.0)	287	530	938.03	496.32
SLE腎炎 (%)			1 (25.0)	3 (75.0)				4 (100.0)	4	8	925.00	427.20
アミロイド腎 (%)									2	2		
痛風腎 (%)			2 (50.0)	2 (50.0)				4 (100.0)	3	7	900.00	454.61
先天性代謝異常 による腎不全 (%)				1 (100.0)				1 (100.0)		1	1000.00	
腎・尿路結核 (%)												
腎・尿路結石 (%)			1 (100.0)					1 (100.0)	1	2	700.00	
腎・尿路腫瘍 (%)				1 (100.0)				1 (100.0)	2	3	1050.00	
閉塞性尿路障害 (%)				1 (100.0)				1 (100.0)	2	3	1500.00	
骨髄腫 (%)									1	1		
腎形成不全 (%)			1 (50.0)	1 (50.0)				2 (100.0)	2	4	1434.00	694.38
不明 (%)	1 (1.6)	1 (1.6)	27 (44.3)	28 (45.9)	3 (4.9)	1 (1.6)		61 (100.0)	89	150	960.02	634.59
再導入 (%)			5 (62.5)	3 (37.5)				8 (100.0)	7	15	943.75	271.82
その他 (%)			8 (47.1)	9 (52.9)				17 (100.0)	23	40	881.59	279.41
合計 (%)	2 (0.2)	11 (1.3)	428 (49.5)	400 (46.3)	20 (2.3)	3 (0.3)		864 (100.0)	884	1,748	936.05	490.69
記載なし (%)												
総計 (%)	2 (0.2)	11 (1.3)	428 (49.5)	400 (46.3)	20 (2.3)	3 (0.3)		864 (100.0)	884	1,748	936.05	490.69

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査