

表 4057 PD透析液交換方法 原疾患別（腹膜透析単独患者）

原疾患	完全手動式	バッグ交換デバイス(紫外線)	バッグ交換デバイス(熱式無菌接合装置)	バッグ交換デバイス(左記以外、半手動も含む)	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	525 (35.3)	753 (50.6)	192 (12.9)	17 (1.1)	1,487 (100.0)	25	817	2,329
慢性腎盂腎炎 (%)	20 (42.6)	19 (40.4)	8 (17.0)		47 (100.0)	2	30	79
急速進行性糸球体腎炎 (%)	9 (25.0)	17 (47.2)	10 (27.8)		36 (100.0)	1	27	64
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	9 (52.9)	4 (23.5)	4 (23.5)		17 (100.0)		5	22
その他の分類不能の腎炎 (%)	17 (39.5)	23 (53.5)	3 (7.0)		43 (100.0)	1	22	66
多発性嚢胞腎 (%)	35 (26.9)	65 (50.0)	26 (20.0)	4 (3.1)	130 (100.0)	3	73	206
腎硬化症 (%)	184 (30.6)	308 (51.2)	103 (17.1)	7 (1.2)	602 (100.0)	11	327	940
悪性高血圧 (%)	15 (29.4)	30 (58.8)	6 (11.8)		51 (100.0)		34	85
糖尿病性腎症 (%)	372 (28.4)	759 (58.0)	150 (11.5)	27 (2.1)	1,308 (100.0)	23	904	2,235
SLE腎炎 (%)	13 (41.9)	12 (38.7)	5 (16.1)	1 (3.2)	31 (100.0)	1	22	54
アミロイド腎 (%)	2 (50.0)	1 (25.0)	1 (25.0)		4 (100.0)		3	7
痛風腎 (%)	7 (41.2)	7 (41.2)	2 (11.8)	1 (5.9)	17 (100.0)	1	8	26
先天性代謝異常による腎不全 (%)	2 (18.2)	8 (72.7)	1 (9.1)		11 (100.0)		6	17
腎・尿路結核 (%)	1 (100.0)				1 (100.0)			1
腎・尿路結石 (%)	4 (50.0)	3 (37.5)	1 (12.5)		8 (100.0)		6	14
腎・尿路腫瘍 (%)	4 (50.0)	2 (25.0)	1 (12.5)	1 (12.5)	8 (100.0)	1	2	11
閉塞性尿路障害 (%)	4 (33.3)	4 (33.3)	4 (33.3)		12 (100.0)	1	6	19
骨髄腫 (%)		3 (100.0)			3 (100.0)		4	7
腎形成不全 (%)	16 (35.6)	22 (48.9)	6 (13.3)	1 (2.2)	45 (100.0)		27	72
不明 (%)	138 (33.8)	208 (51.0)	56 (13.7)	6 (1.5)	408 (100.0)	6	275	689
再導入 (%)	7 (25.9)	13 (48.1)	7 (25.9)		27 (100.0)		9	36
その他 (%)	38 (31.4)	61 (50.4)	21 (17.4)	1 (0.8)	121 (100.0)		88	209
合計 (%)	1,422 (32.2)	2,322 (52.6)	607 (13.7)	66 (1.5)	4,417 (100.0)	76	2,695	7,188
記載なし (%)								
総計 (%)	1,422 (32.2)	2,322 (52.6)	607 (13.7)	66 (1.5)	4,417 (100.0)	76	2,695	7,188

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査