

表 4177 PET Cr D/P比 治療方法(新分類)別 (PD・HD(F)等併用患者)

| 治療方法 (新分類) | 0.5未満 | 0.5～ | 0.65～ | 0.81～ | 合計 | 記載なし | 総計 | 平均 | 標準偏差 |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|-------|-------|------|------|
| 腹膜透析 (CAPD) (%) | 54 (18.2) | 122 (41.2) | 96 (32.4) | 24 (8.1) | 296 (100.0) | 593 | 889 | 0.61 | 0.15 |
| 腹膜透析 (APD) (%) | 6 (3.8) | 63 (39.4) | 62 (38.8) | 29 (18.1) | 160 (100.0) | 341 | 501 | 0.68 | 0.12 |
| 腹膜透析 (CCPD) (%) | 13 (10.2) | 53 (41.4) | 42 (32.8) | 20 (15.6) | 128 (100.0) | 230 | 358 | 0.64 | 0.16 |
| 合計 (%) | 73 (12.5) | 238 (40.8) | 200 (34.2) | 73 (12.5) | 584 (100.0) | 1,164 | 1,748 | 0.64 | 0.15 |
| 記載なし (%) | | | | | | | | | |
| 総計 (%) | 73 (12.5) | 238 (40.8) | 200 (34.2) | 73 (12.5) | 584 (100.0) | 1,164 | 1,748 | 0.64 | 0.15 |

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査