

表 4186 PET Cr D/P比 使用透析液の種類別 (PD・HD(F)等併用患者)

使用透析液の種類	0.5未満	0.5~	0.65~	0.81~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5%液のみ	15 (%)	38 (40.0)	33 (34.7)	9 (9.5)	95 (100.0)	89	184	0.61	0.15
1.5%液と2.5%液の併用	18 (%)	58 (50.9)	28 (24.6)	10 (8.8)	114 (100.0)	107	221	0.61	0.14
2.5%液のみ	6 (%)	15 (60.0)	4 (16.0)		25 (100.0)	26	51	0.51	0.21
4.25%液のみ(イコデキストリンなし)			1 (100.0)		1 (100.0)		1	0.68	
イコデキストリン単独(ブドウ糖使用なし)		2 (50.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	4 (100.0)	2	6	0.66	0.14
1.5%+イコデキストリン	10 (%)	42 (30.4)	57 (41.3)	29 (21.0)	138 (100.0)	79	217	0.68	0.15
1.5%+2.5%+イコデキストリン	13 (%)	49 (42.6)	41 (35.7)	12 (10.4)	115 (100.0)	78	193	0.64	0.12
2.5%+イコデキストリン	9 (%)	27 (35.1)	31 (40.3)	10 (13.0)	77 (100.0)	68	145	0.66	0.13
4.25%液+イコデキストリン						3	3		
(%)									
合計	71 (%)	231 (40.6)	196 (34.4)	71 (12.5)	569 (100.0)	452	1,021	0.64	0.15
不明	2 (%)	6 (42.9)	4 (28.6)	2 (14.3)	14 (100.0)	3	17	0.63	0.14
記載なし		1 (100.0)			1 (100.0)	709	710	0.53	
(%)									
総計	73 (%)	238 (40.8)	200 (34.2)	73 (12.5)	584 (100.0)	1,164	1,748	0.64	0.15

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査