

表 4193 PET Cr D/P比 2014年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年)別 (PD・HD(F)等併用患者)

2014年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年)	0.5未満	0.5～	0.65～	0.81～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0	63	208	175	65	511	379	890	0.64	0.14
(%)	(12.3)	(40.7)	(34.2)	(12.7)	(100.0)				
1.0～	4	16	17	5	42	43	85	0.64	0.16
(%)	(9.5)	(38.1)	(40.5)	(11.9)	(100.0)				
2.0～	2	2	4	1	9	4	13	0.67	0.13
(%)	(22.2)	(22.2)	(44.4)	(11.1)	(100.0)				
3.0～	1	2			3	2	5	0.39	0.34
(%)	(33.3)	(66.7)			(100.0)				
4.0～		2			2		2	0.57	0.08
(%)		(100.0)			(100.0)				
5.0～				1	1	1	2	0.89	
(%)				(100.0)	(100.0)				
合計	70	230	196	72	568	429	997	0.64	0.15
(%)	(12.3)	(40.5)	(34.5)	(12.7)	(100.0)				
不明 記載なし	3	8	4	1	16	735	751	0.60	0.12
(%)	(18.8)	(50.0)	(25.0)	(6.3)	(100.0)				
総計	73	238	200	73	584	1,164	1,748	0.64	0.15
(%)	(12.5)	(40.8)	(34.2)	(12.5)	(100.0)				
平均	0.16	0.15	0.13	0.22	0.15	0.15	0.15		
標準偏差	0.53	0.55	0.39	1.10	0.60	0.48	0.55		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*個々の患者の腹膜炎発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査