

表 4213 残腎Kt/V 降圧薬使用の有無別（腹膜透析患者）

降圧薬使用の有無	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
なし	93	70	103	70	25	7	10	8	386	901	1,287	0.60	0.70
(%)	(19.1)	(15.7)	(21.4)	(21.3)	(13.9)	(14.6)	(29.4)	(30.8)	(19.0)	(21.7)	(20.8)		
あり	395	377	378	258	155	41	24	18	1,646	3,246	4,892	0.56	0.63
(%)	(80.9)	(84.3)	(78.6)	(78.7)	(86.1)	(85.4)	(70.6)	(69.2)	(81.0)	(78.3)	(79.2)		
合計	488	447	481	328	180	48	34	26	2,032	4,147	6,179	0.57	0.65
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明	2	10	5	4	3	1			25	46	71	0.54	0.48
記載なし	20	12	23	17	12	7	5	3	99	2,592	2,691	0.82	0.88
総計	510	469	509	349	195	56	39	29	2,156	6,785	8,941	0.58	0.66

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査