

表 4284 残腎Kt/V 2014年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年)別 (PD・HD(F)等併用患者)

2014年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年)	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0 (%)	227 (67.0)	61 (18.0)	17 (5.0)	13 (3.8)	11 (3.2)	6 (1.8)	2 (0.6)	2 (0.6)	339 (100.0)	551	890	0.20	0.46
1.0～ (%)	15 (62.5)	4 (16.7)	3 (12.5)	1 (4.2)	1 (4.2)				24 (100.0)	61	85	0.19	0.38
2.0～ (%)	2 (50.0)		1 (25.0)	1 (25.0)					4 (100.0)	9	13	0.35	0.47
3.0～ (%)								1 (100.0)	(100.0)	1	4	5	3.50
4.0～ (%)					1 (100.0)				(100.0)	1	1	2	1.30
5.0～ (%)	1 (100.0)								(100.0)	1	1	2	
合計 (%)	245 (66.2)	65 (17.6)	21 (5.7)	15 (4.1)	13 (3.5)	6 (1.6)	2 (0.5)	3 (0.8)	370 (100.0)	627	997	0.21	0.49
記載なし (%)	4 (25.0)	9 (56.3)	2 (12.5)		1 (6.3)				16 (100.0)	735	751	0.24	0.29
総計 (%)	249 (64.5)	74 (19.2)	23 (6.0)	15 (3.9)	14 (3.6)	6 (1.6)	2 (0.5)	3 (0.8)	386 (100.0)	1,362	1,748	0.21	0.48
平均	0.10	0.06	0.24	0.20	0.38				1.00	0.12	0.17	0.15	
標準偏差	0.43	0.24	0.54	0.56	1.12				1.73	0.48	0.59	0.55	

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

*個々の患者の腹膜炎発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査