

表 4322 PD Kt/V 拡張期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

| 拡張期血圧       | 0.1未満       | 0.1～         | 0.4～          | 0.8～          | 1.2～          | 1.7～          | 2.0～         | 2.4～        | 合計               | 記載なし  | 総計    | 平均   | 標準偏差 |
|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|------------------|-------|-------|------|------|
| 20未満<br>(%) |             |              |               | 1<br>(100.0)  |               |               |              |             | 1<br>(100.0)     |       | 1     | 1.00 |      |
| 20～<br>(%)  |             |              |               | 4<br>(100.0)  |               |               |              |             | 4<br>(100.0)     | 11    | 15    | 1.00 | 0.08 |
| 40～<br>(%)  |             | 6<br>(4.6)   | 10<br>(7.6)   | 26<br>(19.8)  | 49<br>(37.4)  | 23<br>(17.6)  | 14<br>(10.7) | 3<br>(2.3)  | 131<br>(100.0)   | 244   | 375   | 1.38 | 0.62 |
| 60～<br>(%)  | 8<br>(1.0)  | 28<br>(3.5)  | 77<br>(9.5)   | 185<br>(22.9) | 306<br>(37.9) | 109<br>(13.5) | 57<br>(7.1)  | 37<br>(4.6) | 807<br>(100.0)   | 1,258 | 2,065 | 1.38 | 0.85 |
| 80～<br>(%)  | 1<br>(0.2)  | 26<br>(5.0)  | 59<br>(11.3)  | 107<br>(20.5) | 215<br>(41.3) | 69<br>(13.2)  | 27<br>(5.2)  | 17<br>(3.3) | 521<br>(100.0)   | 775   | 1,296 | 1.30 | 0.67 |
| 90～<br>(%)  | 2<br>(0.7)  | 15<br>(5.0)  | 37<br>(12.4)  | 63<br>(21.1)  | 112<br>(37.6) | 35<br>(11.7)  | 23<br>(7.7)  | 11<br>(3.7) | 298<br>(100.0)   | 416   | 714   | 1.34 | 0.85 |
| 100～<br>(%) |             | 10<br>(7.6)  | 11<br>(8.4)   | 25<br>(19.1)  | 48<br>(36.6)  | 17<br>(13.0)  | 9<br>(6.9)   | 11<br>(8.4) | 131<br>(100.0)   | 216   | 347   | 1.40 | 0.79 |
| 120～<br>(%) |             | 1<br>(16.7)  |               | 1<br>(16.7)   | 2<br>(33.3)   |               | 2<br>(33.3)  |             | 6<br>(100.0)     | 12    | 18    | 1.33 | 0.69 |
| 140～<br>(%) |             |              |               |               | 1<br>(100.0)  |               |              |             | 1<br>(100.0)     |       | 1     | 1.50 |      |
| 合計<br>(%)   | 11<br>(0.6) | 86<br>(4.5)  | 194<br>(10.2) | 412<br>(21.7) | 733<br>(38.6) | 253<br>(13.3) | 132<br>(6.9) | 79<br>(4.2) | 1,900<br>(100.0) | 2,932 | 4,832 | 1.35 | 0.78 |
| 記載なし<br>(%) | 8<br>(1.6)  | 77<br>(15.9) | 75<br>(15.5)  | 86<br>(17.7)  | 133<br>(27.4) | 63<br>(13.0)  | 31<br>(6.4)  | 12<br>(2.5) | 485<br>(100.0)   | 3,624 | 4,109 | 1.10 | 0.65 |
| 総計<br>(%)   | 19<br>(0.8) | 163<br>(6.8) | 269<br>(11.3) | 498<br>(20.9) | 866<br>(36.3) | 316<br>(13.2) | 163<br>(6.8) | 91<br>(3.8) | 2,385<br>(100.0) | 6,556 | 8,941 | 1.30 | 0.76 |
| 平均          | 78.18       | 81.94        | 80.95         | 78.51         | 79.40         | 78.34         | 78.73        | 81.10       | 79.36            | 78.79 | 79.01 |      |      |
| 標準偏差        | 9.81        | 16.10        | 12.47         | 14.20         | 13.88         | 14.02         | 15.28        | 14.57       | 14.06            | 14.66 | 14.43 |      |      |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査