

表 4398 総透析量 CRP濃度(mg/dL)別（腹膜透析単独患者）

CRP濃度	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	2.8～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.2未満 (%)	1 (0.1)	21 (2.4)	16 (1.8)	28 (3.2)	204 (23.1)	255 (28.9)	203 (23.0)	80 (9.1)	75 (8.5)	883 (100.0)	1,499	2,382	1.98	1.06
0.2～ (%)	1 (0.4)	3 (1.1)	2 (0.7)	9 (3.3)	72 (26.4)	76 (27.8)	65 (23.8)	30 (11.0)	15 (5.5)	273 (100.0)	499	772	1.96	0.95
0.5～ (%)				4 (3.9)	24 (23.5)	34 (33.3)	19 (18.6)	10 (9.8)	11 (10.8)	102 (100.0)	237	339	1.95	0.57
1.0～ (%)		3 (5.4)		1 (1.8)	12 (21.4)	18 (32.1)	13 (23.2)	7 (12.5)	2 (3.6)	56 (100.0)	190	246	1.92	1.08
2.0～ (%)				1 (2.2)	16 (34.8)	12 (26.1)	10 (21.7)	2 (4.3)	5 (10.9)	46 (100.0)	107	153	1.89	0.53
4.0～ (%)					4 (26.7)	4 (26.7)	6 (40.0)		1 (6.7)	15 (100.0)	44	59	1.87	0.41
6.0～ (%)					5 (71.4)	1 (14.3)	1 (14.3)			7 (100.0)	25	32	1.61	0.24
8.0～ (%)				1 (100.0)						1 (100.0)	17	18	0.90	
10.0～ (%)			1 (9.1)		4 (36.4)	2 (18.2)	2 (18.2)	2 (18.2)		11 (100.0)	13	24	1.75	0.60
15.0～ (%)					1 (25.0)		3 (75.0)			4 (100.0)	3	7	1.88	0.39
合計 (%)	2 (0.1)	27 (1.9)	19 (1.4)	44 (3.1)	342 (24.5)	402 (28.8)	322 (23.0)	131 (9.4)	109 (7.8)	1,398 (100.0)	2,634	4,032	1.96	0.98
記載なし (%)	6 (1.9)	7 (2.2)	26 (8.0)	28 (8.7)	75 (23.2)	71 (22.0)	56 (17.3)	21 (6.5)	33 (10.2)	323 (100.0)	2,833	3,156	1.78	0.95
総計 (%)	8 (0.5)	34 (2.0)	45 (2.6)	72 (4.2)	417 (24.2)	473 (27.5)	378 (22.0)	152 (8.8)	142 (8.3)	1,721 (100.0)	5,467	7,188	1.93	0.98
平均	0.16	0.22	0.63	0.48	0.70	0.43	0.65	0.45	0.37	0.55	0.66	0.62		
標準偏差	0.21	0.39	2.34	1.44	2.25	1.12	2.31	1.46	0.77	1.79	1.69	1.73		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査