

表 4407 総透析量 収縮期血圧(mmHg)別（腹膜透析単独患者）

収縮期血圧	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	2.8～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)											1	1		
60～ (%)		1 (20.0)				2 (40.0)	1 (20.0)	1 (20.0)		5 (100.0)	8	13	1.70	0.90
80～ (%)		2 (6.5)	1 (3.2)	2 (6.5)	5 (16.1)	8 (25.8)	5 (16.1)	3 (9.7)	5 (16.1)	31 (100.0)	69	100	1.87	0.81
100～ (%)		1 (0.5)	2 (1.1)	8 (4.3)	41 (22.2)	60 (32.4)	41 (22.2)	19 (10.3)	13 (7.0)	185 (100.0)	332	517	1.93	0.65
120～ (%)	1 (0.2)	5 (1.1)	9 (1.9)	15 (3.2)	119 (25.6)	126 (27.1)	110 (23.7)	40 (8.6)	40 (8.6)	465 (100.0)	769	1,234	2.00	1.10
140～ (%)	1 (0.2)	4 (0.9)	9 (2.0)	13 (2.9)	108 (24.4)	124 (28.1)	111 (25.1)	41 (9.3)	31 (7.0)	442 (100.0)	694	1,136	1.93	0.75
160～ (%)		1 (0.6)	2 (1.1)	5 (2.8)	51 (28.2)	56 (30.9)	29 (16.0)	18 (9.9)	19 (10.5)	181 (100.0)	262	443	2.18	1.60
180～ (%)				1 (2.6)	14 (35.9)	11 (28.2)	7 (17.9)	4 (10.3)	2 (5.1)	39 (100.0)	75	114	1.85	0.53
200～ (%)		1 (14.3)			1 (14.3)	1 (14.3)	3 (42.9)	1 (14.3)		7 (100.0)	6	13	1.83	0.80
220～ (%)						1 (50.0)	1 (50.0)			2 (100.0)	1	3	2.00	0.42
合計 (%)	2 (0.1)	15 (1.1)	23 (1.7)	44 (3.2)	339 (25.0)	389 (28.7)	308 (22.7)	127 (9.4)	110 (8.1)	1,357 (100.0)	2,217	3,574	1.98	1.01
記載なし (%)	6 (1.6)	19 (5.2)	22 (6.0)	28 (7.7)	78 (21.4)	84 (23.1)	70 (19.2)	25 (6.9)	32 (8.8)	364 (100.0)	3,250	3,614	1.73	0.81
総計 (%)	8 (0.5)	34 (2.0)	45 (2.6)	72 (4.2)	417 (24.2)	473 (27.5)	378 (22.0)	152 (8.8)	142 (8.3)	1,721 (100.0)	5,467	7,188	1.93	0.98
平均	140.00	132.47	138.70	136.66	140.69	138.21	138.95	138.72	138.22	138.94	137.97	138.34		
標準偏差	8.49	34.95	19.38	23.22	20.85	21.76	20.82	21.77	21.50	21.46	21.95	21.77		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査