

表 4465 腹膜炎罹患回数(回/年) 2014年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年)別 (腹膜透析患者)

| 2014年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年) | なし | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回以上 | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 | |
|------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|---------|---------------|------------|-------|-------|
| 0 (%) | 4,651 (100.0) | | | | | | | | | | 4,651 | | | 4,651 | |
| 1.0～ (%) | | 485 (100.0) | | | | | | | | | 485 | | | 485 | |
| 2.0～ (%) | | | 21 (22.1) | 74 (77.9) | | | | | | | 95 | | | 95 | |
| 3.0～ (%) | | | | 5 (6.7) | 2 (76.7) | | | | | | 30 | | | 30 | |
| 4.0～ (%) | | | | | 3 (26.7) | 4 (13.3) | 2 (40.0) | | | | 15 | | | 15 | |
| 5.0～ (%) | | | | | | 13 (52.0) | 2 (8.0) | 2 (8.0) | 1 (4.0) | 4 (16.0) | 1 (4.0) | 1 (4.0) | 25 (100.0) | | 25 |
| 合計 (%) | 4,651 (87.7) | 527 (9.9) | 82 (1.5) | 27 (0.5) | 7 (0.1) | 4 (0.1) | 1 (0.0) | | | 1 (0.0) | 1 (0.0) | 5,301 (100.0) | | | 5,301 |
| 不明 記載なし (%) | | | | | | | | | | | | 79 | 3,561 | 3,640 | |
| 総計 (%) | 4,651 (87.7) | 527 (9.9) | 82 (1.5) | 27 (0.5) | 7 (0.1) | 4 (0.1) | 1 (0.0) | | | 1 (0.0) | 1 (0.0) | 5,301 (100.0) | 79 | 3,561 | 8,941 |
| 平均 | | 1.30 | 2.26 | 3.27 | 4.46 | 5.00 | 18.00 | | | 8.00 | 9.00 | 0.20 | | | 0.20 |
| 標準偏差 | | 1.27 | 0.78 | 0.64 | 1.07 | | | | | | | 0.75 | | | 0.75 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*個々の患者の腹膜炎発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査