

表 931 脳出血の既往 原疾患別（腹膜透析患者）

原疾患	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	1,814	75	1,889	5	936	2,830
(%)	(96.0)	(4.0)	(100.0)			
慢性腎盂腎炎	73	3	76		21	97
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			
急速進行性糸球体腎炎	38	2	40		26	66
(%)	(95.0)	(5.0)	(100.0)			
妊娠腎/妊娠中毒症	24		24		3	27
(%)	(100.0)		(100.0)			
その他の分類不能の腎炎	49	5	54		24	78
(%)	(90.7)	(9.3)	(100.0)			
多発性嚢胞腎	161	6	167		96	263
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
腎硬化症	684	41	725	1	369	1,095
(%)	(94.3)	(5.7)	(100.0)			
悪性高血圧	62	6	68		39	107
(%)	(91.2)	(8.8)	(100.0)			
糖尿病性腎症	1,742	78	1,820	8	971	2,799
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
SLE腎炎	29	3	32		14	46
(%)	(90.6)	(9.4)	(100.0)			
アミロイド腎	10		10		5	15
(%)	(100.0)		(100.0)			
痛風腎	26		26		6	32
(%)	(100.0)		(100.0)			
先天性代謝異常による腎不全	9	1	10		7	17
(%)	(90.0)	(10.0)	(100.0)			
腎・尿路結核					2	2
(%)						
腎・尿路結石	12	2	14		7	21
(%)	(85.7)	(14.3)	(100.0)			
腎・尿路腫瘍	11		11		3	14
(%)	(100.0)		(100.0)			
閉塞性尿路障害	14		14		7	21
(%)	(100.0)		(100.0)			
骨髄腫	3		3		4	7
(%)	(100.0)		(100.0)			
腎形成不全	47	2	49		23	72
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
不明	519	27	546	7	289	842
(%)	(95.1)	(4.9)	(100.0)			
再導入	27	1	28		27	55
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
その他	160	5	165	1	97	263
(%)	(97.0)	(3.0)	(100.0)			
合計	5,514	257	5,771	22	2,976	8,769
(%)	(95.5)	(4.5)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	5,514	257	5,771	22	2,976	8,769
(%)	(95.5)	(4.5)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査