

表 1284 大腿骨近位部骨折の既往 年齢(歳)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

年齢	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	1 (100.0)		1 (100.0)			1
15歳～ (%)	153 (99.4)	1 (0.6)	154 (100.0)		46	200
30歳～ (%)	2,324 (99.0)	23 (1.0)	2,347 (100.0)	2	568	2,917
45歳～ (%)	8,776 (98.4)	146 (1.6)	8,922 (100.0)	10	2,274	11,206
60歳～ (%)	17,608 (96.4)	654 (3.6)	18,262 (100.0)	15	4,880	23,157
75歳～ (%)	8,429 (92.7)	668 (7.3)	9,097 (100.0)	14	2,416	11,527
90歳～ (%)	383 (84.2)	72 (15.8)	455 (100.0)	1	117	573
合計 (%)	37,674 (96.0)	1,564 (4.0)	39,238 (100.0)	42	10,301	49,581
不明 (%)						
記載なし (%)						
総計 (%)	37,674 (96.0)	1,564 (4.0)	39,238 (100.0)	42	10,301	49,581
平均	65.11	72.95	65.42	67.02	65.59	65.46
標準偏差	12.47	11.21	12.52	13.42	12.36	12.49

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査