

表 1285 大腿骨近位部骨折の既往 透析歴(年)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析歴	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	4,965 (97.5)	126 (2.5)	5,091 (100.0)	7	1,307	6,405
2年～ (%)	8,450 (96.6)	301 (3.4)	8,751 (100.0)	9	2,309	11,069
5年～ (%)	9,624 (95.5)	451 (4.5)	10,075 (100.0)	6	2,693	12,774
10年～ (%)	5,746 (95.4)	275 (4.6)	6,021 (100.0)	12	1,530	7,563
15年～ (%)	3,618 (96.6)	129 (3.4)	3,747 (100.0)	4	945	4,696
20年～ (%)	2,337 (96.4)	88 (3.6)	2,425 (100.0)	2	631	3,058
25年～ (%)	1,454 (95.5)	69 (4.5)	1,523 (100.0)	1	406	1,930
30年～ (%)	882 (94.2)	54 (5.8)	936 (100.0)	1	260	1,197
35年～ (%)	451 (90.9)	45 (9.1)	496 (100.0)		142	638
40年～ (%)	141 (85.5)	24 (14.5)	165 (100.0)		32	197
合計 (%)	37,668 (96.0)	1,562 (4.0)	39,230 (100.0)	42	10,255	49,527
不明 (%)	6 (75.0)	2 (25.0)	8 (100.0)		46	54
記載なし (%)						
総計 (%)	37,674 (96.0)	1,564 (4.0)	39,238 (100.0)	42	10,301	49,581
平均	9.62	11.26	9.68	8.79	9.68	9.68
標準偏差	8.65	9.84	8.70	7.47	8.73	8.71

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査