

表 1332 大腿骨近位部骨折の既往 原疾患別（腹膜透析患者）

原疾患	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	1,845	32	1,877	5	948	2,830
(%)	(98.3)	(1.7)	(100.0)			
慢性腎盂腎炎	74	2	76		21	97
(%)	(97.4)	(2.6)	(100.0)			
急速進行性糸球体腎炎	38	1	39		27	66
(%)	(97.4)	(2.6)	(100.0)			
妊娠腎/妊娠中毒症	24		24		3	27
(%)	(100.0)		(100.0)			
その他の分類不能の腎炎	53		53		25	78
(%)	(100.0)		(100.0)			
多発性嚢胞腎	165	1	166		97	263
(%)	(99.4)	(0.6)	(100.0)			
腎硬化症	703	18	721	2	372	1,095
(%)	(97.5)	(2.5)	(100.0)			
悪性高血圧	67		67		40	107
(%)	(100.0)		(100.0)			
糖尿病性腎症	1,757	52	1,809	4	986	2,799
(%)	(97.1)	(2.9)	(100.0)			
SLE腎炎	30	1	31		15	46
(%)	(96.8)	(3.2)	(100.0)			
アミロイド腎	9	1	10		5	15
(%)	(90.0)	(10.0)	(100.0)			
痛風腎	26		26		6	32
(%)	(100.0)		(100.0)			
先天性代謝異常による腎不全	10		10		7	17
(%)	(100.0)		(100.0)			
腎・尿路結核					2	2
(%)						
腎・尿路結石	15		15		6	21
(%)	(100.0)		(100.0)			
腎・尿路腫瘍	11		11		3	14
(%)	(100.0)		(100.0)			
閉塞性尿路障害	14		14		7	21
(%)	(100.0)		(100.0)			
骨髄腫	3		3		4	7
(%)	(100.0)		(100.0)			
腎形成不全	49		49		23	72
(%)	(100.0)		(100.0)			
不明	527	17	544	5	293	842
(%)	(96.9)	(3.1)	(100.0)			
再導入	27	1	28		27	55
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
その他	157	11	168		95	263
(%)	(93.5)	(6.5)	(100.0)			
合計	5,604	137	5,741	16	3,012	8,769
(%)	(97.6)	(2.4)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	5,604	137	5,741	16	3,012	8,769
(%)	(97.6)	(2.4)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査