

表 1426 降圧薬使用の有無 透析歴(年)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析歴	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満	13,011	30,474	43,485	217	7,168	50,870
(%)	(29.9)	(70.1)	(100.0)			
2年～	14,808	33,468	48,276	215	8,364	56,855
(%)	(30.7)	(69.3)	(100.0)			
5年～	15,194	33,442	48,636	187	8,000	56,823
(%)	(31.2)	(68.8)	(100.0)			
10年～	8,253	16,391	24,644	117	4,132	28,893
(%)	(33.5)	(66.5)	(100.0)			
15年～	4,866	7,887	12,753	49	2,140	14,942
(%)	(38.2)	(61.8)	(100.0)			
20年～	2,893	3,783	6,676	32	1,070	7,778
(%)	(43.3)	(56.7)	(100.0)			
25年～	1,636	1,712	3,348	17	619	3,984
(%)	(48.9)	(51.1)	(100.0)			
30年～	997	808	1,805	4	305	2,114
(%)	(55.2)	(44.8)	(100.0)			
35年～	571	326	897	6	167	1,070
(%)	(63.7)	(36.3)	(100.0)			
40年～	175	77	252		33	285
(%)	(69.4)	(30.6)	(100.0)			
合計	62,404	128,368	190,772	844	31,998	223,614
(%)	(32.7)	(67.3)	(100.0)			
不明	23	30	53	4	180	237
(%)	(43.4)	(56.6)	(100.0)			
記載なし		1	1			1
(%)		(100.0)	(100.0)			
総計	62,427	128,399	190,826	848	32,178	223,852
(%)	(32.7)	(67.3)	(100.0)			
平均	7.99	6.46	6.96	6.71	6.97	6.96
標準偏差	8.09	6.51	7.10	7.14	7.12	7.10

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査