

表 1510 喫煙の有無 治療方法別（透析患者全体）

| 治療方法 | 現在吸っていない (%) | 現在吸っている | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|---------------|-------------------|------------------|--------------------|--------|--------|---------|
| 施設血液透析 (%) | 154,179 (87.8) | 21,513 (12.2) | 175,692 (100.0) | 12,470 | 60,563 | 248,725 |
| 血液透析濾過 (%) | 33,073 (86.7) | 5,094 (13.3) | 38,167 (100.0) | 2,259 | 13,350 | 53,776 |
| 血液濾過 (%) | 10 (100.0) | | 10 (100.0) | 2 | 4 | 16 |
| 血液吸着透析 (%) | 968 (90.5) | 102 (9.5) | 1,070 (100.0) | 62 | 244 | 1,376 |
| 在宅血液透析 (%) | 335 (89.6) | 39 (10.4) | 374 (100.0) | 12 | 169 | 555 |
| 腹膜透析 (%) | 4,742 (90.2) | 513 (9.8) | 5,255 (100.0) | 523 | 2,991 | 8,769 |
| 合計 (%) | 193,307 (87.6) | 27,261 (12.4) | 220,568 (100.0) | 15,328 | 77,321 | 313,217 |
| 記載なし (%) | | | | | | |
| 総計 (%) | 193,307 (87.6) | 27,261 (12.4) | 220,568 (100.0) | 15,328 | 77,321 | 313,217 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査