

表 1512 喫煙の有無 併用の状況別（透析患者全体）

| 併用の状況 | 現在吸っていない | 現在吸っている | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|--------------------|----------|---------|---------|--------|--------|---------|
| HD(F)単独 | 188,384 | 26,727 | 215,111 | 14,789 | 74,263 | 304,163 |
| (%) | (87.6) | (12.4) | (100.0) | | | |
| PD単独 | 3,741 | 391 | 4,132 | 423 | 2,549 | 7,104 |
| (%) | (90.5) | (9.5) | (100.0) | | | |
| HD(F)単独.PDカテあり | 107 | 17 | 124 | 11 | 47 | 182 |
| (%) | (86.3) | (13.7) | (100.0) | | | |
| PD.HD併用週1 HD(F) | 872 | 107 | 979 | 90 | 401 | 1,470 |
| (%) | (89.1) | (10.9) | (100.0) | | | |
| PD.HD併用週2 HD(F) | 112 | 11 | 123 | 9 | 40 | 172 |
| (%) | (91.1) | (8.9) | (100.0) | | | |
| PD.HD併用週3 HD(F) | 21 | 1 | 22 | 1 | 6 | 29 |
| (%) | (95.5) | (4.5) | (100.0) | | | |
| PD.HD併用週4 HD(F) | | | | | | |
| (%) | | | | | | |
| PD.HD併用その他 | 49 | 4 | 53 | 5 | 13 | 71 |
| (%) | (92.5) | (7.5) | (100.0) | | | |
| 合計 | 193,286 | 27,258 | 220,544 | 15,328 | 77,319 | 313,191 |
| (%) | (87.6) | (12.4) | (100.0) | | | |
| 不明 | 21 | 3 | 24 | | 1 | 25 |
| (%) | (87.5) | (12.5) | (100.0) | | | |
| 記載なし | | | | | 1 | 1 |
| (%) | | | | | | |
| 総計 | 193,307 | 27,261 | 220,568 | 15,328 | 77,321 | 313,217 |
| (%) | (87.6) | (12.4) | (100.0) | | | |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査