

表 1804 週透析回数(回/週) 治療方法別（透析患者全体）

治療方法	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析 (%)	561 (0.2)	5,356 (2.3)	223,853 (97.1)	637 (0.3)	16 (0.0)	55 (0.0)	1 (0.0)	230,479 (100.0)	18,246	248,725	2.98	0.19
血液透析濾過 (%)	56 (0.1)	514 (1.0)	49,581 (98.4)	242 (0.5)	4 (0.0)	5 (0.0)		50,402 (100.0)	3,374	53,776	2.99	0.14
血液濾過 (%)	1 (7.7)		12 (92.3)					13 (100.0)	3	16	2.85	0.55
血液吸着透析 (%)	1 (0.1)	2 (0.2)	1,325 (99.5)	4 (0.3)				1,332 (100.0)	44	1,376	3.00	0.08
在宅血液透析 (%)	12 (2.7)	3 (0.7)	128 (29.0)	116 (26.2)	76 (17.2)	79 (17.9)	28 (6.3)	442 (100.0)	113	555	4.38	1.35
腹膜透析 (%)	1,223 (91.3)	114 (8.5)	3 (0.2)					1,340 (100.0)	7,429	8,769	1.09	0.29
合計 (%)	1,854 (0.7)	5,989 (2.1)	274,902 (96.8)	999 (0.4)	96 (0.0)	139 (0.0)	29 (0.0)	284,008 (100.0)	29,209	313,217	2.97	0.24
記載なし (%)												
総計 (%)	1,854 (0.7)	5,989 (2.1)	274,902 (96.8)	999 (0.4)	96 (0.0)	139 (0.0)	29 (0.0)	284,008 (100.0)	29,209	313,217	2.97	0.24

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査