

表 2546 クレアチニン濃度(mg/dL) 医療機関別（腹膜透析患者）

医療機関	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	2	10	35	67	74	74	50	25	22	359	304	663	9.96	3.62
(%)	(0.6)	(2.8)	(9.7)	(18.7)	(20.6)	(20.6)	(13.9)	(7.0)	(6.1)	(100.0)				
私立大学	1	11	63	126	167	149	101	44	37	699	407	1,106	10.00	3.59
(%)	(0.1)	(1.6)	(9.0)	(18.0)	(23.9)	(21.3)	(14.4)	(6.3)	(5.3)	(100.0)				
国立		5	24	37	40	23	21	7	2	159	63	222	8.83	3.15
(%)		(3.1)	(15.1)	(23.3)	(25.2)	(14.5)	(13.2)	(4.4)	(1.3)	(100.0)				
県市町村立	1	27	129	224	258	190	143	85	50	1,107	466	1,573	9.65	3.53
(%)	(0.1)	(2.4)	(11.7)	(20.2)	(23.3)	(17.2)	(12.9)	(7.7)	(4.5)	(100.0)				
社会保険	1	4	19	40	44	32	30	11	8	189	333	522	9.61	3.26
(%)	(0.5)	(2.1)	(10.1)	(21.2)	(23.3)	(16.9)	(15.9)	(5.8)	(4.2)	(100.0)				
厚生連		8	30	99	115	83	49	32	14	430	130	560	9.66	3.12
(%)		(1.9)	(7.0)	(23.0)	(26.7)	(19.3)	(11.4)	(7.4)	(3.3)	(100.0)				
その他公的	2	28	93	236	215	178	97	64	39	952	407	1,359	9.47	3.75
(%)	(0.2)	(2.9)	(9.8)	(24.8)	(22.6)	(18.7)	(10.2)	(6.7)	(4.1)	(100.0)				
私立総合		8	18	37	79	82	55	20	20	319	44	363	10.42	3.25
(%)		(2.5)	(5.6)	(11.6)	(24.8)	(25.7)	(17.2)	(6.3)	(6.3)	(100.0)				
私立	3	32	131	211	260	234	183	98	68	1,220	479	1,699	9.98	3.66
(%)	(0.2)	(2.6)	(10.7)	(17.3)	(21.3)	(19.2)	(15.0)	(8.0)	(5.6)	(100.0)				
私立診療所	3	9	38	78	114	111	96	72	41	562	140	702	10.77	3.54
(%)	(0.5)	(1.6)	(6.8)	(13.9)	(20.3)	(19.8)	(17.1)	(12.8)	(7.3)	(100.0)				
総計	13	142	580	1,155	1,366	1,156	825	458	301	5,996	2,773	8,769	9.87	3.57
(%)	(0.2)	(2.4)	(9.7)	(19.3)	(22.8)	(19.3)	(13.8)	(7.6)	(5.0)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査