

表 2612 equilibrated Kt/V(eKt/V) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

性別	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	92	268	2,030	11,001	31,696	34,936	15,345	4,449	1,228	707	101,752	8,002	109,754	1.24	0.24
(%)	(0.1)	(0.3)	(2.0)	(10.8)	(31.2)	(34.3)	(15.1)	(4.4)	(1.2)	(0.7)	(100.0)				
女性	38	105	504	2,671	8,417	15,736	16,241	9,088	3,450	1,886	58,136	4,854	62,990	1.42	0.29
(%)	(0.1)	(0.2)	(0.9)	(4.6)	(14.5)	(27.1)	(27.9)	(15.6)	(5.9)	(3.2)	(100.0)				
合計	130	373	2,534	13,672	40,113	50,672	31,586	13,537	4,678	2,593	159,888	12,856	172,744	1.30	0.27
(%)	(0.1)	(0.2)	(1.6)	(8.6)	(25.1)	(31.7)	(19.8)	(8.5)	(2.9)	(1.6)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	130	373	2,534	13,672	40,113	50,672	31,586	13,537	4,678	2,593	159,888	12,856	172,744	1.30	0.27
(%)	(0.1)	(0.2)	(1.6)	(8.6)	(25.1)	(31.7)	(19.8)	(8.5)	(2.9)	(1.6)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査