

表 2644 nPCR(g/kg/day) 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

原疾患	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 （％）	15 (0.1)	365 (2.4)	3,554 (23.0)	7,086 (45.8)	3,664 (23.7)	688 (4.5)	70 (0.5)	11 (0.1)	2 (0.0)	2 (0.0)	15,457 (100.0)	869	16,326	0.91	0.17
慢性腎盂腎炎 （％）		9 (2.0)	112 (25.5)	207 (47.0)	93 (21.1)	15 (3.4)	3 (0.7)	1 (0.2)			440 (100.0)	16	456	0.90	0.17
急速進行性糸球 体腎炎 （％）		13 (4.6)	47 (16.6)	128 (45.2)	82 (29.0)	13 (4.6)					283 (100.0)	12	295	0.92	0.17
妊娠腎/妊娠中毒 症 （％）		6 (1.6)	71 (19.5)	164 (45.1)	95 (26.1)	23 (6.3)	3 (0.8)	1 (0.3)	1 (0.3)		364 (100.0)	25	389	0.94	0.18
その他の分類不 能の腎炎 （％）		10 (4.4)	66 (28.9)	93 (40.8)	44 (19.3)	14 (6.1)	1 (0.4)				228 (100.0)	14	242	0.89	0.18
多発性嚢胞腎 （％）		25 (1.5)	419 (25.9)	768 (47.5)	337 (20.9)	64 (4.0)	2 (0.1)	1 (0.1)			1,616 (100.0)	92	1,708	0.89	0.16
腎硬化症 （％）	7 (0.2)	110 (3.9)	820 (29.0)	1,290 (45.6)	509 (18.0)	78 (2.8)	12 (0.4)	1 (0.0)		2 (0.1)	2,829 (100.0)	159	2,988	0.87	0.17
悪性高血圧 （％）		8 (2.5)	90 (28.0)	148 (46.1)	59 (18.4)	15 (4.7)	1 (0.3)				321 (100.0)	14	335	0.89	0.16
糖尿病性腎症 （％）	18 (0.1)	680 (5.2)	4,657 (35.5)	5,670 (43.2)	1,798 (13.7)	269 (2.0)	25 (0.2)	4 (0.0)		2 (0.0)	13,123 (100.0)	852	13,975	0.84	0.16
SLE腎炎 （％）		6 (1.7)	74 (20.7)	154 (43.1)	88 (24.6)	27 (7.6)	8 (2.2)				357 (100.0)	21	378	0.94	0.19
アミロイド腎 （％）		3 (6.7)	14 (31.1)	16 (35.6)	10 (22.2)	2 (4.4)					45 (100.0)	4	49	0.88	0.19
痛風腎 （％）		6 (3.9)	49 (32.0)	68 (44.4)	25 (16.3)	4 (2.6)	1 (0.7)				153 (100.0)	5	158	0.86	0.17
先天性代謝異常 による腎不全 （％）			9 (20.9)	11 (25.6)	20 (46.5)	3 (7.0)					43 (100.0)	3	46	0.98	0.18
腎・尿路結核 （％）			8 (29.6)	11 (40.7)	8 (29.6)						27 (100.0)	1	28	0.90	0.17
腎・尿路結石 （％）		2 (2.9)	15 (22.1)	29 (42.6)	18 (26.5)	3 (4.4)	1 (1.5)				68 (100.0)	2	70	0.93	0.17
腎・尿路腫瘍 （％）		1 (1.2)	26 (30.6)	38 (44.7)	19 (22.4)	1 (1.2)					85 (100.0)	5	90	0.88	0.15
閉塞性尿路障害 （％）		5 (5.5)	25 (27.5)	34 (37.4)	23 (25.3)	4 (4.4)					91 (100.0)	5	96	0.89	0.17
骨髄腫 （％）		1 (4.5)	5 (22.7)	11 (50.0)	4 (18.2)	1 (4.5)					22 (100.0)	3	25	0.89	0.17
腎形成不全 （％）		1 (0.8)	25 (20.8)	52 (43.3)	31 (25.8)	11 (9.2)					120 (100.0)	6	126	0.94	0.17
不明 （％）	7 (0.2)	138 (3.8)	995 (27.1)	1,631 (44.4)	731 (19.9)	154 (4.2)	17 (0.5)	3 (0.1)			3,676 (100.0)	265	3,941	0.88	0.18
再導入 （％）		6 (1.5)	76 (18.4)	186 (45.1)	111 (26.9)	22 (5.3)	10 (2.4)	1 (0.2)			412 (100.0)	24	436	0.94	0.18
その他 （％）		29 (3.2)	224 (24.6)	435 (47.9)	182 (20.0)	35 (3.9)	4 (0.4)				909 (100.0)	50	959	0.89	0.17
合計 （％）	47 (0.1)	1,424 (3.5)	11,381 (28.0)	18,230 (44.8)	7,951 (19.6)	1,446 (3.6)	158 (0.4)	23 (0.1)	3 (0.0)	6 (0.0)	40,669 (100.0)	2,447	43,116	0.88	0.17
記載なし （％）				4 (66.7)	1 (16.7)	1 (16.7)					6 (100.0)		6	0.97	0.18
総計 （％）	47 (0.1)	1,424 (3.5)	11,381 (28.0)	18,234 (44.8)	7,952 (19.6)	1,447 (3.6)	158 (0.4)	23 (0.1)	3 (0.0)	6 (0.0)	40,675 (100.0)	2,447	43,122	0.88	0.17

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査