

表 2781 アルブミン濃度(g/dL) 透析歴(年)別 (腹膜透析患者)

透析歴	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)	10 (0.4)	34 (1.4)	137 (5.6)	454 (18.7)	880 (36.2)	719 (29.6)	176 (7.2)	18 (0.7)		2,428 (100.0)	1,252	3,680	3.24	0.53
2年～ (%)	4 (0.2)	27 (1.3)	96 (4.6)	356 (17.0)	825 (39.4)	641 (30.6)	135 (6.4)	8 (0.4)	2 (0.1)	2,094 (100.0)	1,008	3,102	3.27	0.51
5年～ (%)	4 (0.4)	7 (0.7)	33 (3.1)	176 (16.6)	473 (44.7)	315 (29.8)	45 (4.3)	3 (0.3)	2 (0.2)	1,058 (100.0)	462	1,520	3.27	0.47
10年～ (%)	1 (0.4)	6 (2.4)	16 (6.4)	50 (19.9)	102 (40.6)	64 (25.5)	12 (4.8)			251 (100.0)	63	314	3.19	0.52
15年～ (%)			7 (11.9)	13 (22.0)	21 (35.6)	16 (27.1)	1 (1.7)	1 (1.7)		59 (100.0)	28	87	3.17	0.50
20年～ (%)			1 (6.3)	4 (25.0)	6 (37.5)	4 (25.0)	1 (6.3)			16 (100.0)	10	26	3.20	0.46
25年～ (%)		1 (11.1)	1 (11.1)	2 (22.2)	2 (22.2)	3 (33.3)				9 (100.0)	3	12	2.99	0.67
30年～ (%)				2 (40.0)	2 (40.0)	1 (20.0)				5 (100.0)	1	6	3.16	0.38
35年～ (%)		1 (50.0)				1 (50.0)				2 (100.0)		2	2.55	1.48
40年～ (%)					1 (100.0)					1 (100.0)	1	2	3.10	
合計 (%)	19 (0.3)	76 (1.3)	291 (4.9)	1,057 (17.8)	2,312 (39.0)	1,764 (29.8)	370 (6.2)	30 (0.5)	4 (0.1)	5,923 (100.0)	2,828	8,751	3.25	0.51
不明 (%)					3 (75.0)	1 (25.0)				4 (100.0)	14	18	3.30	0.22
記載なし (%)														
総計 (%)	19 (0.3)	76 (1.3)	291 (4.9)	1,057 (17.8)	2,315 (39.1)	1,765 (29.8)	370 (6.2)	30 (0.5)	4 (0.1)	5,927 (100.0)	2,842	8,769	3.25	0.51
平均	2.84	3.49	3.01	3.11	3.28	3.05	2.39	2.07	4.25	3.11	2.76	2.99		
標準偏差	3.24	5.67	3.97	3.83	3.60	3.55	2.85	3.08	0.96	3.64	3.35	3.55		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査