

表 3058 PTH値(pg/mL) 性別（腹膜透析患者）PTH測定法:whole-PTH

性別	20未満	20～	35～	50～	75～	100～	125～	150～	151～	180～	210～	240～	300～	350～	400～	500～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	31	41	37	74	55	42	35	1	30	22	15	21	13	3	6	7	433	31	464	122.77	114.52
(%)	(7.2)	(9.5)	(8.5)	(17.1)	(12.7)	(9.7)	(8.1)	(0.2)	(6.9)	(5.1)	(3.5)	(4.8)	(3.0)	(0.7)	(1.4)	(1.6)	(100.0)				
女性	19	16	19	31	21	30	21		18	9	11	7	4	4	7	9	226	8	234	148.37	168.83
(%)	(8.4)	(7.1)	(8.4)	(13.7)	(9.3)	(13.3)	(9.3)		(8.0)	(4.0)	(4.9)	(3.1)	(1.8)	(1.8)	(3.1)	(4.0)	(100.0)				
合計	50	57	56	105	76	72	56	1	48	31	26	28	17	7	13	16	659	39	698	131.55	136.03
(%)	(7.6)	(8.6)	(8.5)	(15.9)	(11.5)	(10.9)	(8.5)	(0.2)	(7.3)	(4.7)	(3.9)	(4.2)	(2.6)	(1.1)	(2.0)	(2.4)	(100.0)				
記載なし																					
(%)																					
総計	50	57	56	105	76	72	56	1	48	31	26	28	17	7	13	16	659	39	698	131.55	136.03
(%)	(7.6)	(8.6)	(8.5)	(15.9)	(11.5)	(10.9)	(8.5)	(0.2)	(7.3)	(4.7)	(3.9)	(4.2)	(2.6)	(1.1)	(2.0)	(2.4)	(100.0)				

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査