

表 3184 HDL-C濃度(mg/dL) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

性別	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	89	1,965	6,032	6,466	4,826	2,712	1,272	584	258	215	24,419	7,211	31,630	48.19	16.16
(%)	(0.4)	(8.0)	(24.7)	(26.5)	(19.8)	(11.1)	(5.2)	(2.4)	(1.1)	(0.9)	(100.0)				
女性	27	473	1,961	3,213	3,187	2,198	1,405	698	349	268	13,779	4,172	17,951	55.49	17.88
(%)	(0.2)	(3.4)	(14.2)	(23.3)	(23.1)	(16.0)	(10.2)	(5.1)	(2.5)	(1.9)	(100.0)				
合計	116	2,438	7,993	9,679	8,013	4,910	2,677	1,282	607	483	38,198	11,383	49,581	50.82	17.16
(%)	(0.3)	(6.4)	(20.9)	(25.3)	(21.0)	(12.9)	(7.0)	(3.4)	(1.6)	(1.3)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	116	2,438	7,993	9,679	8,013	4,910	2,677	1,282	607	483	38,198	11,383	49,581	50.82	17.16
(%)	(0.3)	(6.4)	(20.9)	(25.3)	(21.0)	(12.9)	(7.0)	(3.4)	(1.6)	(1.3)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査