

表 3194 HDL-C濃度(mg/dL) 性別（腹膜透析患者）

性別	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	12	262	719	699	516	302	130	62	23	30	2,755	2,919	5,674	47.50	16.60
(%)	(0.4)	(9.5)	(26.1)	(25.4)	(18.7)	(11.0)	(4.7)	(2.3)	(0.8)	(1.1)	(100.0)				
女性	6	53	261	390	307	239	144	68	31	19	1,518	1,577	3,095	53.65	17.49
(%)	(0.4)	(3.5)	(17.2)	(25.7)	(20.2)	(15.7)	(9.5)	(4.5)	(2.0)	(1.3)	(100.0)				
合計	18	315	980	1,089	823	541	274	130	54	49	4,273	4,496	8,769	49.69	17.18
(%)	(0.4)	(7.4)	(22.9)	(25.5)	(19.3)	(12.7)	(6.4)	(3.0)	(1.3)	(1.1)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	18	315	980	1,089	823	541	274	130	54	49	4,273	4,496	8,769	49.69	17.18
(%)	(0.4)	(7.4)	(22.9)	(25.5)	(19.3)	(12.7)	(6.4)	(3.0)	(1.3)	(1.1)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査