

表 3243 透析前収縮期血圧(mmHg) 治療方法別（透析患者全体）

治療方法	60未満	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析 （％）	33 (0.0)	327 (0.1)	2,794 (1.3)	15,448 (7.1)	46,841 (21.4)	71,941 (32.9)	53,752 (24.6)	20,903 (9.6)	5,280 (2.4)	1,093 (0.5)	218,412 (100.0)	30,313	248,725	151.80	24.28
血液透析濾過 （％）	11 (0.0)	94 (0.2)	860 (1.8)	3,610 (7.5)	10,141 (21.1)	15,434 (32.1)	11,638 (24.2)	4,709 (9.8)	1,256 (2.6)	281 (0.6)	48,034 (100.0)	5,742	53,776	151.64	25.18
血液濾過 （％）			1 (9.1)	2 (18.2)	3 (27.3)	3 (27.3)	1 (9.1)	1 (9.1)			11 (100.0)	5	16	137.64	28.10
血液吸着透析 （％）	2 (0.2)	4 (0.3)	41 (3.3)	163 (13.0)	329 (26.2)	413 (32.8)	223 (17.7)	70 (5.6)	10 (0.8)	3 (0.2)	1,258 (100.0)	118	1,376	142.76	24.69
在宅血液透析 （％）			13 (3.6)	54 (15.1)	105 (29.3)	126 (35.2)	46 (12.8)	10 (2.8)	3 (0.8)	1 (0.3)	358 (100.0)	197	555	139.47	22.51
腹膜透析 （％）		20 (0.4)	169 (3.2)	620 (11.7)	1,723 (32.4)	1,714 (32.3)	800 (15.1)	209 (3.9)	47 (0.9)	11 (0.2)	5,313 (100.0)	3,456	8,769	141.13	22.83
合計 （％）	46 (0.0)	445 (0.2)	3,878 (1.4)	19,897 (7.3)	59,142 (21.6)	89,631 (32.8)	66,460 (24.3)	25,902 (9.5)	6,596 (2.4)	1,389 (0.5)	273,386 (100.0)	39,831	313,217	151.51	24.47
記載なし （％）															
総計 （％）	46 (0.0)	445 (0.2)	3,878 (1.4)	19,897 (7.3)	59,142 (21.6)	89,631 (32.8)	66,460 (24.3)	25,902 (9.5)	6,596 (2.4)	1,389 (0.5)	273,386 (100.0)	39,831	313,217	151.51	24.47

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査