

表 3342 現在施行中のPD歴(年) 治療方法(新分類)別(腹膜透析単独患者)

| 治療方法<br>(新分類)  | 1年未満    | 1年～     | 2年～     | 4年～     | 6年～     | 8年～     | 10年～    | 合計      | 記載なし    | 総計      | 平均   | 標準偏差 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| 腹膜透析<br>(CAPD) | 735     | 585     | 695     | 354     | 145     | 78      | 69      | 2,661   | 1,417   | 4,078   | 2.79 | 2.76 |
| (%)            | (55.4)  | (54.8)  | (54.8)  | (58.5)  | (61.4)  | (77.2)  | (63.9)  | (56.5)  | (59.2)  | (57.4)  |      |      |
| 腹膜透析<br>(APD)  | 490     | 366     | 427     | 174     | 55      | 16      | 23      | 1,551   | 742     | 2,293   | 2.32 | 2.26 |
| (%)            | (37.0)  | (34.3)  | (33.6)  | (28.8)  | (23.3)  | (15.8)  | (21.3)  | (32.9)  | (31.0)  | (32.3)  |      |      |
| 腹膜透析<br>(CCPD) | 101     | 116     | 147     | 77      | 36      | 7       | 16      | 500     | 233     | 733     | 3.12 | 3.01 |
| (%)            | (7.6)   | (10.9)  | (11.6)  | (12.7)  | (15.3)  | (6.9)   | (14.8)  | (10.6)  | (9.7)   | (10.3)  |      |      |
| 合計             | 1,326   | 1,067   | 1,269   | 605     | 236     | 101     | 108     | 4,712   | 2,392   | 7,104   | 2.67 | 2.65 |
| (%)            | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) |      |      |
| 記載なし           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |      |
| 総計             | 1,326   | 1,067   | 1,269   | 605     | 236     | 101     | 108     | 4,712   | 2,392   | 7,104   | 2.67 | 2.65 |

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

\*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査