

表 3620 残腎Kt/V 併用の状況別（腹膜透析患者）

併用の状況	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
HD(F)単独 (%)										1	1		
PD単独 (%)	272 (15.7)	362 (20.8)	464 (26.7)	328 (18.9)	190 (10.9)	61 (3.5)	35 (2.0)	25 (1.4)	1,737 (100.0)	5,367	7,104	0.66	0.61
HD(F)単独.PDカテ あり (%)													
PD.HD併用週1 HD(F) (%)	196 (60.3)	71 (21.8)	24 (7.4)	12 (3.7)	12 (3.7)	6 (1.8)	3 (0.9)	1 (0.3)	325 (100.0)	1,145	1,470	0.23	0.58
PD.HD併用週2 HD(F) (%)	7 (77.8)				1 (11.1)			1 (11.1)	9 (100.0)	123	132	0.42	0.87
PD.HD併用週3 HD(F) (%)													
PD.HD併用週4 HD(F) (%)													
PD.HD併用その他 (%)	4 (80.0)	1 (20.0)							5 (100.0)	57	62	0.02	0.04
合計 (%)	479 (23.1)	434 (20.9)	488 (23.5)	340 (16.4)	203 (9.8)	67 (3.2)	38 (1.8)	27 (1.3)	2,076 (100.0)	6,693	8,769	0.59	0.62
不明 (%)													
記載なし (%)													
総計 (%)	479 (23.1)	434 (20.9)	488 (23.5)	340 (16.4)	203 (9.8)	67 (3.2)	38 (1.8)	27 (1.3)	2,076 (100.0)	6,693	8,769	0.59	0.62

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査