

表 3817 出口部感染罹患回数(回/年) 治療方法(新分類)別 (腹膜透析患者)

治療方法 (新分類)	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
腹膜透析 (CAPD) (%)	2,338 (80.2)	402 (13.8)	113 (3.9)	34 (1.2)	13 (0.4)	8 (0.3)	1 (0.0)	3 (0.1)	2 (0.1)	3 (0.1)	2,917 (100.0)	5	1,980	4,902
腹膜透析 (APD) (%)	1,351 (80.5)	227 (13.5)	56 (3.3)	26 (1.5)	9 (0.5)	5 (0.3)	4 (0.2)				1,678 (100.0)	10	1,087	2,775
腹膜透析 (CCPD) (%)	549 (78.3)	108 (15.4)	21 (3.0)	12 (1.7)	8 (1.1)		1 (0.1)		1 (0.1)	1 (0.1)	701 (100.0)	1	390	1,092
合計 (%)	4,238 (80.0)	737 (13.9)	190 (3.6)	72 (1.4)	30 (0.6)	13 (0.2)	6 (0.1)	3 (0.1)	3 (0.1)	4 (0.1)	5,296 (100.0)	16	3,457	8,769
記載なし (%)														
総計 (%)	4,238 (80.0)	737 (13.9)	190 (3.6)	72 (1.4)	30 (0.6)	13 (0.2)	6 (0.1)	3 (0.1)	3 (0.1)	4 (0.1)	5,296 (100.0)	16	3,457	8,769

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

\*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査