

表 3835 出口部感染罹患回数(回/年) 治療方法(新分類)別 (腹膜透析単独患者)

| 治療方法 (新分類) | なし | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回以上 | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|-----------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----|-------|-------|
| 腹膜透析 (CAPD) (%) | 1,952 (80.2) | 331 (13.6) | 92 (3.8) | 31 (1.3) | 12 (0.5) | 7 (0.3) | 1 (0.0) | 3 (0.1) | 2 (0.1) | 2 (0.1) | 2,433 (100.0) | 4 | 1,641 | 4,078 |
| 腹膜透析 (APD) (%) | 1,122 (79.9) | 194 (13.8) | 46 (3.3) | 25 (1.8) | 9 (0.6) | 5 (0.4) | 4 (0.3) | | | | 1,405 (100.0) | 8 | 880 | 2,293 |
| 腹膜透析 (CCPD) (%) | 372 (77.3) | 78 (16.2) | 13 (2.7) | 8 (1.7) | 8 (1.7) | | 1 (0.2) | | 1 (0.2) | | 481 (100.0) | 1 | 251 | 733 |
| 合計 (%) | 3,446 (79.8) | 603 (14.0) | 151 (3.5) | 64 (1.5) | 29 (0.7) | 12 (0.3) | 6 (0.1) | 3 (0.1) | 3 (0.1) | 2 (0.0) | 4,319 (100.0) | 13 | 2,772 | 7,104 |
| 記載なし (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 総計 (%) | 3,446 (79.8) | 603 (14.0) | 151 (3.5) | 64 (1.5) | 29 (0.7) | 12 (0.3) | 6 (0.1) | 3 (0.1) | 3 (0.1) | 2 (0.0) | 4,319 (100.0) | 13 | 2,772 | 7,104 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査