

表 124 2016年導入患者、性別、原疾患別

原疾患	男性	女性	合計	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	4,007 (15.7)	2,179 (18.6)	6,186 (16.6)		6,186 (16.6)
慢性腎孟腎炎 (%)	138 (0.5)	120 (1.0)	258 (0.7)		258 (0.7)
急速進行性糸球体腎炎 (%)	242 (0.9)	233 (2.0)	475 (1.3)		475 (1.3)
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)		24 (0.2)	24 (0.1)		24 (0.1)
その他の分類不能の腎炎 (%)	107 (0.4)	62 (0.5)	169 (0.5)		169 (0.5)
多発性囊胞腎 (%)	549 (2.2)	423 (3.6)	972 (2.6)		972 (2.6)
腎硬化症 (%)	3,674 (14.4)	1,611 (13.7)	5,285 (14.2)		5,285 (14.2)
悪性高血圧 (%)	201 (0.8)	89 (0.8)	290 (0.8)		290 (0.8)
糖尿病性腎症 (%)	11,792 (46.2)	4,311 (36.7)	16,103 (43.2)		16,103 (43.2)
SLE腎炎 (%)	86 (0.3)	133 (1.1)	219 (0.6)		219 (0.6)
アミロイド腎 (%)	33 (0.1)	47 (0.4)	80 (0.2)		80 (0.2)
痛風腎 (%)	61 (0.2)	11 (0.1)	72 (0.2)		72 (0.2)
先天性代謝異常による腎不全 (%)	15 (0.1)	8 (0.1)	23 (0.1)		23 (0.1)
腎・尿路結核 (%)	7 (0.0)	2 (0.0)	9 (0.0)		9 (0.0)
腎・尿路結石 (%)	33 (0.1)	22 (0.2)	55 (0.1)		55 (0.1)
腎・尿路腫瘍 (%)	150 (0.6)	41 (0.3)	191 (0.5)		191 (0.5)
閉塞性尿路障害 (%)	61 (0.2)	29 (0.2)	90 (0.2)		90 (0.2)
骨髄腫 (%)	80 (0.3)	73 (0.6)	153 (0.4)		153 (0.4)
腎形成不全 (%)	34 (0.1)	13 (0.1)	47 (0.1)		47 (0.1)
不明 (%)	3,077 (12.1)	1,683 (14.3)	4,760 (12.8)	1 (100.0)	4,761 (12.8)
再導入 (%)	159 (0.6)	79 (0.7)	238 (0.6)		238 (0.6)
その他 (%)	1,001 (3.9)	551 (4.7)	1,552 (4.2)		1,552 (4.2)
合計 (%)	25,507 (100.0)	11,744 (100.0)	37,251 (100.0)	1 (100.0)	37,252 (100.0)
記載なし					
総計	25,507	11,744	37,251	1	37,252

数値下のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

##A0059##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査