表 132 2016年導入患者，治療方法(新分類)，年齢別

治療方法 (新分類)	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～
施設血液透析	2			11	39	78	163	315	745	1,120	1,469	1,755
(%)	(20.0)			(50.0)	(69.6)	(73.6)	(69.4)	(68.5)	(74.6)	(72.9)	(75.9)	(76.9)
Off-line HDF							1	3	3	11	9	12
(%)							(0.4)	(0.7)	(0.3)	(0.7)	(0.5)	(0.5)
On-line HDF					7	10	29	56	106	183	201	221
(%)					(12.5)	(9.4)	(12.3)	(12.2)	(10.6)	(11.9)	(10.4)	(9.7)
Push/Pull HDF											1	
(%)											(0.1)	
ﾊﾞｲｵﾌｨﾙﾄﾚｰｼｮﾝ												
(%)												
IHDF				2	1	1	5	17	28	38	50	64
(%)				(9.1)	(1.8)	(0.9)	(2.1)	(3.7)	(2.8)	(2.5)	(2.6)	(2.8)
血液濾過												
(%)												
血液吸着透析 (ﾘｸｾﾙ等使用)												
(%)												
在宅血液透析							1		1	3	1	1
(%)							(0.4)		(0.1)	(0.2)	(0.1)	(0.0)
腹膜透析 (CAPD)				1	2	5	15	24	49	72	104	111
(%)				(4.5)	(3.6)	(4.7)	(6.4)	(5.2)	(4.9)	(4.7)	(5.4)	(4.9)
腹膜透析 (APD)	6	4	7	6	4	2	13	11	31	52	61	73
(%)	(60.0)	(50.0)	(100.0)	(27.3)	(7.1)	(1.9)	(5.5)	(2.4)	(3.1)	(3.4)	(3.2)	(3.2)
腹膜透析 (CCPD)	2	1		1		1	2	6	8	18	12	18
(%)	(20.0)	(12.5)		(4.5)		(0.9)	(0.9)	(1.3)	(0.8)	(1.2)	(0.6)	(0.8)
透析離脱								1		3	7	3
(%)								(0.2)		(0.2)	(0.4)	(0.1)
生体腎移植 (親から)		3		1	3	8	5	20	20	12	5	1
(%)		(37.5)		(4.5)	(5.4)	(7.5)	(2.1)	(4.3)	(2.0)	(0.8)	(0.3)	(0.0)
生体腎移植 (祖父母から)												
(%)												
生体腎移植 (兄弟から)						1		3	3	3	3	3
(%)						(0.9)		(0.7)	(0.3)	(0.2)	(0.2)	(0.1)
生体腎移植 (子から)												1
(%)												(0.0)
生体腎移植 (それ以外の血縁者から)										1		
(%)										(0.1)		
生体腎移植 (配偶者から)								3	2	14	11	16
(%)								(0.7)	(0.2)	(0.9)	(0.6)	(0.7)
生体腎移植 (上記以外から)									1	4		1
(%)									(0.1)	(0.3)		(0.0)
献腎移植 (生体腎か献腎か不明の場合)							1	1	1	3	1	1
(%)							(0.4)	(0.2)	(0.1)	(0.2)	(0.1)	(0.0)
献腎移植												
(%)												
合計	10	8	7	22	56	106	235	460	998	1,537	1,935	2,281
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)
記載なし					2	5	6	12	38	48	76	94
総計	10	8	7	22	58	111	241	472	1,036	1,585	2,011	2,375

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの
##A0067##
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査

表 132 2016年導入患者，治療方法(新分類)，年齢別

治療方法 (新分類)	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析	2,574	4,400	4,078	4,537	4,191	2,320	602	53	28,452		2	28,454	69.76	12.98
(%)	(80.9)	(81.5)	(83.0)	(85.9)	(85.5)	(86.2)	(86.7)	(85.5)	(81.8)		(100.0)	(81.8)		
Off-line HDF	11	20	25	22	32	15	4		168			168	70.04	13.60
(%)	(0.3)	(0.4)	(0.5)	(0.4)	(0.7)	(0.6)	(0.6)		(0.5)			(0.5)		
On-line HDF	278	504	424	390	371	198	44	1	3,023			3,023	67.18	13.67
(%)	(8.7)	(9.3)	(8.6)	(7.4)	(7.6)	(7.4)	(6.3)	(1.6)	(8.7)			(8.7)		
Push/Pull HDF		1							2			2	61.00	11.31
(%)		(0.0)							(0.0)			(0.0)		
ﾊﾞｲｵﾌｨﾙﾄﾚｰｼｮﾝ		1	1		1				3			3	73.33	8.02
(%)		(0.0)	(0.0)		(0.0)				(0.0)			(0.0)		
IHDF	85	156	156	150	129	76	16	2	976			976	69.28	13.01
(%)	(2.7)	(2.9)	(3.2)	(2.8)	(2.6)	(2.8)	(2.3)	(3.2)	(2.8)			(2.8)		
血液濾過		1							1			1	65.00	
(%)		(0.0)							(0.0)			(0.0)		
血液吸着透析 (リクヤル等併用)	1								1			1	64.00	
(%)	(0.0)								(0.0)			(0.0)		
在宅血液透析		1	1		1				10			10	56.00	14.93
(%)		(0.0)	(0.0)		(0.0)				(0.0)			(0.0)		
腹膜透析 (CAPD)	123	173	148	107	102	53	19	3	1,111			1,111	64.75	13.93
(%)	(3.9)	(3.2)	(3.0)	(2.0)	(2.1)	(2.0)	(2.7)	(4.8)	(3.2)			(3.2)		
腹膜透析 (APD)	72	102	51	40	38	17	6	2	598			598	59.72	16.82
(%)	(2.3)	(1.9)	(1.0)	(0.8)	(0.8)	(0.6)	(0.9)	(3.2)	(1.7)			(1.7)		
腹膜透析 (CCPD)	16	22	10	15	13	2			147			147	59.67	16.29
(%)	(0.5)	(0.4)	(0.2)	(0.3)	(0.3)	(0.1)			(0.4)			(0.4)		
透析離脱	6	6	15	17	23	9	3	1	94			94	73.64	11.86
(%)	(0.2)	(0.1)	(0.3)	(0.3)	(0.5)	(0.3)	(0.4)	(1.6)	(0.3)			(0.3)		
生体腎移植 (親から)	1								79			79	37.90	10.05
(%)	(0.0)								(0.2)			(0.2)		
生体腎移植 (祖父母から)														
(%)														
生体腎移植 (兄弟から)	3	1	1						21			21	50.76	10.83
(%)	(0.1)	(0.0)	(0.0)						(0.1)			(0.1)		
生体腎移植 (子から)	1			2					4			4	68.75	10.72
(%)	(0.0)			(0.0)					(0.0)			(0.0)		
生体腎移植 (それ以外の血縁者から)									1			1	47.00	
(%)									(0.0)			(0.0)		
生体腎移植 (配偶者から)	11	12	4	2					75			75	56.96	9.27
(%)	(0.3)	(0.2)	(0.1)	(0.0)					(0.2)			(0.2)		
生体腎移植 (上記以外から)									6			6	46.83	5.98
(%)									(0.0)			(0.0)		
献腎移植 (生体腎か献腎か不明の場合)									8			8	45.25	7.55
(%)									(0.0)			(0.0)		
献腎移植														
(%)														
合計	3,182	5,400	4,914	5,282	4,901	2,690	694	62	34,780		2	34,782	69.04	13.38
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)	(100.0)		
記載なし	144	312	287	436	538	353	101	18	2,470			2,470	74.48	11.96
総計	3,326	5,712	5,201	5,718	5,439	3,043	795	80	37,250		2	37,252	69.40	13.36

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの
##A0067##
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査