

表 232 2016年末患者，治療方法(新分類)，併用の状況別

併用の状況	施設血液透析	Off-line HDF	On-line HDF	Push/Pull HDF	ハイオ フィルトレーション	IHDF	血液濾過	血液吸着 透析 (リクセル等 使用)	在宅血液 透析	腹膜透析 (CAPD)	腹膜透析 (APD)	腹膜透析 (CCPD)	合計	記載なし	総計
HD(F)単独 (%)	233,427 (99.9)	4,621 (99.9)	59,068 (99.9)	66 (100.0)	250 (100.0)	10,721 (99.9)	19 (100.0)	1,353 (99.9)	613 (99.7)				310,138 (97.2)		310,138 (97.2)
PD単独 (%)										4,136 (83.4)	2,118 (80.5)	677 (67.4)	6,931 (2.2)		6,931 (2.2)
HD(F)単独.PDカテあり (%)	139 (0.1)	2 (0.0)	30 (0.1)			5 (0.0)			1 (0.2)				177 (0.1)		177 (0.1)
PD.HD併用週1HD(F) (%)										723 (14.6)	473 (18.0)	300 (29.9)	1,496 (0.5)		1,496 (0.5)
PD.HD併用週2HD(F) (%)	31 (0.0)	1 (0.0)	11 (0.0)			2 (0.0)				74 (1.5)	28 (1.1)	18 (1.8)	165 (0.1)		165 (0.1)
PD.HD併用週3HD(F) (%)	35 (0.0)		2 (0.0)										37 (0.0)		37 (0.0)
PD.HD併用週4HD(F) (%)			1 (0.0)										1 (0.0)		1 (0.0)
PD.HD併用その他 (%)	10 (0.0)		2 (0.0)					1 (0.1)	1 (0.2)	28 (0.6)	11 (0.4)	10 (1.0)	63 (0.0)		63 (0.0)
合計 (%)	233,642 (100.0)	4,624 (100.0)	59,114 (100.0)	66 (100.0)	250 (100.0)	10,728 (100.0)	19 (100.0)	1,354 (100.0)	615 (100.0)	4,961 (100.0)	2,630 (100.0)	1,005 (100.0)	319,008 (100.0)		319,008 (100.0)
不明	4	10	1					1	2	2	2		22		22
記載なし	58	3	1		2					10	5		79		79
総計	233,704	4,637	59,116	66	252	10,728	19	1,355	617	4,973	2,637	1,005	319,109		319,109

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
 *腹膜透析 (CCPD) は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの
 ##A0167##
 (C)Japanese Society for Dialysis Therapy
 2016年調査