

表 252 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係) (北海道)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	308	150	458		458
(%)	(30.1)	(28.5)	(29.5)		(29.5)
脳血管障害	75	37	112		112
(%)	(7.3)	(7.0)	(7.2)		(7.2)
感染症	180	74	254		254
(%)	(17.6)	(14.0)	(16.4)		(16.4)
消化管出血	11	10	21		21
(%)	(1.1)	(1.9)	(1.4)		(1.4)
悪性腫瘍	119	46	165		165
(%)	(11.6)	(8.7)	(10.6)		(10.6)
悪液質/尿毒症	45	48	93		93
(%)	(4.4)	(9.1)	(6.0)		(6.0)
心筋梗塞	33	14	47		47
(%)	(3.2)	(2.7)	(3.0)		(3.0)
カリウム中毒/頓死	26	21	47		47
(%)	(2.5)	(4.0)	(3.0)		(3.0)
肝硬変症	9	5	14		14
(%)	(0.9)	(0.9)	(0.9)		(0.9)
自殺/拒否	6	1	7		7
(%)	(0.6)	(0.2)	(0.5)		(0.5)
腸閉塞	15	2	17		17
(%)	(1.5)	(0.4)	(1.1)		(1.1)
肺血栓/肺塞栓	2		2		2
(%)	(0.2)		(0.1)		(0.1)
災害・事故死	5		5		5
(%)	(0.5)		(0.3)		(0.3)
その他	78	51	129		129
(%)	(7.6)	(9.7)	(8.3)		(8.3)
不明	111	68	179		179
(%)	(10.9)	(12.9)	(11.5)		(11.5)
合計	1,023	527	1,550		1,550
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	1,023	527	1,550		1,550

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。  
 ##A0187##  
 (C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
 2016年調査