

表 265 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係) (神奈川県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全 (%)	281 (23.9)	186 (32.1)	467 (26.6)		467 (26.6)
脳血管障害 (%)	53 (4.5)	47 (8.1)	100 (5.7)		100 (5.7)
感染症 (%)	261 (22.2)	123 (21.2)	384 (21.9)		384 (21.9)
消化管出血 (%)	19 (1.6)	9 (1.6)	28 (1.6)		28 (1.6)
悪性腫瘍 (%)	124 (10.5)	39 (6.7)	163 (9.3)		163 (9.3)
悪液質/尿毒症 (%)	51 (4.3)	27 (4.7)	78 (4.4)		78 (4.4)
心筋梗塞 (%)	42 (3.6)	13 (2.2)	55 (3.1)		55 (3.1)
カリウム中毒/頓死 (%)	31 (2.6)	8 (1.4)	39 (2.2)		39 (2.2)
肝硬変症 (%)	10 (0.9)	1 (0.2)	11 (0.6)		11 (0.6)
自殺/拒否 (%)	9 (0.8)	5 (0.9)	14 (0.8)		14 (0.8)
腸閉塞 (%)	20 (1.7)	3 (0.5)	23 (1.3)		23 (1.3)
肺血栓/肺塞栓 (%)	2 (0.2)	1 (0.2)	3 (0.2)		3 (0.2)
災害・事故死 (%)	13 (1.1)	1 (0.2)	14 (0.8)		14 (0.8)
その他 (%)	104 (8.8)	45 (7.8)	149 (8.5)		149 (8.5)
不明 (%)	156 (13.3)	72 (12.4)	228 (13.0)		228 (13.0)
合計 (%)	1,176 (100.0)	580 (100.0)	1,756 (100.0)		1,756 (100.0)
記載なし					
総計	1,176	580	1,756		1,756

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

#A0200##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査