

表 277 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係) (京都府)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全 (%)	112 (27.0)	53 (26.6)	165 (26.9)		165 (26.9)
脳血管障害 (%)	15 (3.6)	7 (3.5)	22 (3.6)		22 (3.6)
感染症 (%)	98 (23.6)	55 (27.6)	153 (24.9)		153 (24.9)
消化管出血 (%)	8 (1.9)	3 (1.5)	11 (1.8)		11 (1.8)
悪性腫瘍 (%)	69 (16.6)	20 (10.1)	89 (14.5)		89 (14.5)
悪液質/尿毒症 (%)	13 (3.1)	6 (3.0)	19 (3.1)		19 (3.1)
心筋梗塞 (%)	14 (3.4)	7 (3.5)	21 (3.4)		21 (3.4)
カリウム中毒/頓死 (%)	12 (2.9)	8 (4.0)	20 (3.3)		20 (3.3)
肝硬変症 (%)	4 (1.0)	1 (0.5)	5 (0.8)		5 (0.8)
自殺/拒否 (%)	3 (0.7)	1 (0.5)	4 (0.7)		4 (0.7)
腸閉塞 (%)	3 (0.7)	8 (4.0)	11 (1.8)		11 (1.8)
肺血栓/肺塞栓 (%)		2 (1.0)	2 (0.3)		2 (0.3)
災害・事故死 (%)	2 (0.5)	1 (0.5)	3 (0.5)		3 (0.5)
その他 (%)	36 (8.7)	15 (7.5)	51 (8.3)		51 (8.3)
不明 (%)	26 (6.3)	12 (6.0)	38 (6.2)		38 (6.2)
合計 (%)	415 (100.0)	199 (100.0)	614 (100.0)		614 (100.0)
記載なし					
総計	415	199	614		614

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

#A0212##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査