

表 279 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係) (兵庫県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全 (%)	259 (31.0)	114 (27.2)	373 (29.7)		373 (29.7)
脳血管障害 (%)	36 (4.3)	24 (5.7)	60 (4.8)		60 (4.8)
感染症 (%)	189 (22.6)	91 (21.7)	280 (22.3)		280 (22.3)
消化管出血 (%)	10 (1.2)	3 (0.7)	13 (1.0)		13 (1.0)
悪性腫瘍 (%)	85 (10.2)	36 (8.6)	121 (9.6)		121 (9.6)
悪液質/尿毒症 (%)	15 (1.8)	22 (5.3)	37 (3.0)		37 (3.0)
心筋梗塞 (%)	34 (4.1)	19 (4.5)	53 (4.2)		53 (4.2)
カリウム中毒/頓死 (%)	13 (1.6)	5 (1.2)	18 (1.4)		18 (1.4)
肝硬変症 (%)	9 (1.1)	2 (0.5)	11 (0.9)		11 (0.9)
自殺/拒否 (%)	8 (1.0)	3 (0.7)	11 (0.9)		11 (0.9)
腸閉塞 (%)	12 (1.4)	6 (1.4)	18 (1.4)		18 (1.4)
肺血栓/肺塞栓 (%)	1 (0.1)	2 (0.5)	3 (0.2)		3 (0.2)
災害・事故死 (%)	8 (1.0)	2 (0.5)	10 (0.8)		10 (0.8)
その他 (%)	48 (5.7)	31 (7.4)	79 (6.3)		79 (6.3)
不明 (%)	108 (12.9)	59 (14.1)	167 (13.3)		167 (13.3)
合計 (%)	835 (100.0)	419 (100.0)	1,254 (100.0)		1,254 (100.0)
記載なし					
総計	835	419	1,254		1,254

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0214##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査