

表 281 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(和歌山県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	65	44	109		109
(%)	(34.6)	(46.3)	(38.5)		(38.5)
脳血管障害	11	6	17		17
(%)	(5.9)	(6.3)	(6.0)		(6.0)
感染症	47	17	64		64
(%)	(25.0)	(17.9)	(22.6)		(22.6)
消化管出血	1	3	4		4
(%)	(0.5)	(3.2)	(1.4)		(1.4)
悪性腫瘍	22	6	28		28
(%)	(11.7)	(6.3)	(9.9)		(9.9)
悪液質/尿毒症	2	3	5		5
(%)	(1.1)	(3.2)	(1.8)		(1.8)
心筋梗塞	12	4	16		16
(%)	(6.4)	(4.2)	(5.7)		(5.7)
カリウム中毒/頓死	5	1	6		6
(%)	(2.7)	(1.1)	(2.1)		(2.1)
肝硬変症	3	2	5		5
(%)	(1.6)	(2.1)	(1.8)		(1.8)
自殺/拒否	2		2		2
(%)	(1.1)		(0.7)		(0.7)
腸閉塞	1		1		1
(%)	(0.5)		(0.4)		(0.4)
肺血栓/肺塞栓					
(%)					
災害・事故死	1		1		1
(%)	(0.5)		(0.4)		(0.4)
その他	6	4	10		10
(%)	(3.2)	(4.2)	(3.5)		(3.5)
不明	10	5	15		15
(%)	(5.3)	(5.3)	(5.3)		(5.3)
合計	188	95	283		283
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	188	95	283		283

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0216##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査