

表 285 2016年死亡患者死亡原因分類(性別との関係) (広島県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全 (%)	144 (28.8)	71 (25.4)	215 (27.6)		215 (27.6)
脳血管障害 (%)	38 (7.6)	24 (8.6)	62 (7.9)		62 (7.9)
感染症 (%)	126 (25.2)	73 (26.1)	199 (25.5)		199 (25.5)
消化管出血 (%)	2 (0.4)	6 (2.1)	8 (1.0)		8 (1.0)
悪性腫瘍 (%)	62 (12.4)	23 (8.2)	85 (10.9)		85 (10.9)
悪液質/尿毒症 (%)	19 (3.8)	18 (6.4)	37 (4.7)		37 (4.7)
心筋梗塞 (%)	24 (4.8)	14 (5.0)	38 (4.9)		38 (4.9)
カリウム中毒/頓死 (%)	11 (2.2)	7 (2.5)	18 (2.3)		18 (2.3)
肝硬変症 (%)	4 (0.8)	2 (0.7)	6 (0.8)		6 (0.8)
自殺/拒否 (%)	2 (0.4)	1 (0.4)	3 (0.4)		3 (0.4)
腸閉塞 (%)	5 (1.0)	3 (1.1)	8 (1.0)		8 (1.0)
肺血栓/肺塞栓 (%)					
災害・事故死 (%)	2 (0.4)	2 (0.7)	4 (0.5)		4 (0.5)
その他 (%)	30 (6.0)	21 (7.5)	51 (6.5)		51 (6.5)
不明 (%)	31 (6.2)	15 (5.4)	46 (5.9)		46 (5.9)
合計 (%)	500 (100.0)	280 (100.0)	780 (100.0)		780 (100.0)
記載なし					
総計	500	280	780		780

数値下のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

#A0220##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査