

表 600 脳梗塞の既往 透析歴(年)別 (腹膜透析患者)

透析歴	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満	2,119	234	2,353	30	1,235	3,618
(%)	(90.1)	(9.9)	(100.0)			
2年～	1,706	258	1,964	4	1,016	2,984
(%)	(86.9)	(13.1)	(100.0)			
5年～	864	156	1,020	3	552	1,575
(%)	(84.7)	(15.3)	(100.0)			
10年～	173	36	209	4	76	289
(%)	(82.8)	(17.2)	(100.0)			
15年～	57	9	66	1	18	85
(%)	(86.4)	(13.6)	(100.0)			
20年～	16	5	21		7	28
(%)	(76.2)	(23.8)	(100.0)			
25年～	3	2	5		4	9
(%)	(60.0)	(40.0)	(100.0)			
30年～	4	1	5		1	6
(%)	(80.0)	(20.0)	(100.0)			
35年～					1	1
(%)						
40年～	2		2			2
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	4,944	701	5,645	42	2,910	8,597
(%)	(87.6)	(12.4)	(100.0)			
不明	2		2		16	18
(%)	(100.0)		(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	4,946	701	5,647	42	2,926	8,615
(%)	(87.6)	(12.4)	(100.0)			
平均	3.01	3.68	3.09	2.38	2.91	3.03
標準偏差	3.57	3.98	3.63	4.39	3.26	3.52

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0342##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査