

表 637 大腿骨近位部骨折の既往 原疾患別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

原疾患	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	43,448 (95.4)	2,086 (4.6)	45,534 (100.0)	112	11,526	57,172
慢性腎孟腎炎 (%)	1,402 (94.0)	90 (6.0)	1,492 (100.0)	8	368	1,868
急速進行性糸球体腎炎 (%)	1,303 (94.9)	70 (5.1)	1,373 (100.0)	5	309	1,687
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	641 (93.6)	44 (6.4)	685 (100.0)	7	157	849
その他の分類不能の腎炎 (%)	634 (93.8)	42 (6.2)	676 (100.0)	4	222	902
多発性囊胞腎 (%)	5,870 (96.6)	204 (3.4)	6,074 (100.0)	12	1,462	7,548
腎硬化症 (%)	16,453 (94.4)	973 (5.6)	17,426 (100.0)	45	4,047	21,518
悪性高血圧 (%)	1,379 (97.0)	43 (3.0)	1,422 (100.0)	15	340	1,777
糖尿病性腎症 (%)	63,563 (94.5)	3,678 (5.5)	67,241 (100.0)	241	16,986	84,468
SLE腎炎 (%)	1,014 (91.9)	89 (8.1)	1,103 (100.0)	4	263	1,370
アミロイド腎 (%)	210 (90.9)	21 (9.1)	231 (100.0)	1	48	280
痛風腎 (%)	564 (96.1)	23 (3.9)	587 (100.0)	3	110	700
先天性代謝異常による腎不全 (%)	130 (96.3)	5 (3.7)	135 (100.0)	1	33	169
腎・尿路結核 (%)	70 (87.5)	10 (12.5)	80 (100.0)		26	106
腎・尿路結石 (%)	316 (96.0)	13 (4.0)	329 (100.0)	3	52	384
腎・尿路腫瘍 (%)	509 (96.8)	17 (3.2)	526 (100.0)	2	116	644
閉塞性尿路障害 (%)	365 (95.1)	19 (4.9)	384 (100.0)	1	80	465
骨髓腫 (%)	172 (95.6)	8 (4.4)	180 (100.0)	1	32	213
腎形成不全 (%)	293 (97.7)	7 (2.3)	300 (100.0)		68	368
不明 (%)	14,899 (94.2)	925 (5.8)	15,824 (100.0)	98	4,556	20,478
再導入 (%)	915 (95.7)	41 (4.3)	956 (100.0)	3	205	1,164
その他 (%)	3,998 (95.0)	210 (5.0)	4,208 (100.0)	26	1,172	5,406
合計 (%)	158,148 (94.8)	8,618 (5.2)	166,766 (100.0)	592	42,178	209,536
記載なし (%)						
総計 (%)	158,148 (94.8)	8,618 (5.2)	166,766 (100.0)	592	42,178	209,536

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D0523##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査