

表 663 降圧薬使用の有無 透析歴(年)別 (透析患者全体)

透析歴	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満	16,109	38,822	54,931	412	15,195	70,538
(%)	(29.3)	(70.7)	(100.0)			
2年～	19,061	43,003	62,064	307	17,797	80,168
(%)	(30.7)	(69.3)	(100.0)			
5年～	19,372	42,349	61,721	313	17,111	79,145
(%)	(31.4)	(68.6)	(100.0)			
10年～	10,990	21,025	32,015	179	8,362	40,556
(%)	(34.3)	(65.7)	(100.0)			
15年～	6,716	10,656	17,372	90	4,632	22,094
(%)	(38.7)	(61.3)	(100.0)			
20年～	4,258	5,540	9,798	63	2,623	12,484
(%)	(43.5)	(56.5)	(100.0)			
25年～	2,623	2,776	5,399	32	1,466	6,897
(%)	(48.6)	(51.4)	(100.0)			
30年～	1,703	1,404	3,107	29	851	3,987
(%)	(54.8)	(45.2)	(100.0)			
35年～	1,031	685	1,716	12	424	2,152
(%)	(60.1)	(39.9)	(100.0)			
40年～	431	201	632	6	155	793
(%)	(68.2)	(31.8)	(100.0)			
合計	82,294	166,461	248,755	1,443	68,616	318,814
(%)	(33.1)	(66.9)	(100.0)			
不明	32	45	77	7	211	295
(%)	(41.6)	(58.4)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	82,326	166,506	248,832	1,450	68,827	319,109
(%)	(33.1)	(66.9)	(100.0)			
平均	8.63	6.77	7.38	7.40	7.22	7.35
標準偏差	8.69	6.94	7.62	8.29	7.52	7.60

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0715##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査